

## Ce se poate observa pe teren în luna august – repere

Romanii au înlocuit numele lunii a șasea din calendarul lor, numită *sextilis*, cu *augustus*, în onoarea împăratului *Octavian August*, adăugându-i încă o zi, pentru a nu fi cu nimic mai prejos decât iulie, dedicată celuiilalt cezar. Numele popular la români este *gustar*.

### Plante:

În luna august domnește vara, cca. 46 % dintre plante fiind acum în floare. Printre cele cu **flori albe** care înfloresc acum sunt *Spiranthes spirales* și troscotul-japonez (*Reynoutria japonica*), o plantă invazivă care din păcate este cultivată ornamental în Transilvania. La Valea Vinului din județul Bistrița-Năsăud, spre exemplu, *Reynoutria japonica* formează colonii compacte. De asemenea, în luna august le regăsim înflorite pe următoarele plante cu **flori albe**: săgeata-apelor (*Sagittaria sagittifolia*), limbarița (*Alisma plantago-aquatica*), pungulița (*Thlaspi arvense*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), *Hutchinsia alpina*, ciucușoara sau albița (*Berteroa incana*), lilicelele (*Iberis amara*), *Cochlearia officinalis pyrenaica*, ridichea-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), năsturelul (*Nasturtium officinale*), frigurelele (*Cardaminopsis arenosa*), sânzâienele (*Galium mollugo*), *Galium palustre*, *Galium boreale*, *Galium sylvaticum*, lipicioasa (*Galium aparine*), *Galium rotundifolium*, tilișca (*Circaea alpina*), liliuța (*Anthericum ramosum*), steregoaia (*Veratrum album*), nufărul-alb (*Nymphaea alba*), *Ranunculus fluitans*, clintița (*Ranunculus circinatus*), oițele (*Anemone narcissiflora*), *Silene rupestris*, gușa-porumbelului (*Silene vulgaris*), *Silene nutans*, *Gypsophila repens*, *Arenaria serpyllifolia*, hrana-vacii (*Spergula arvensis*), *Cerastium alpinum*, *Cerastium holosteoides*, săpunarița sau odogaciul (*Saponaria officinalis*), rocoina (*Stellaria media*), iarba-moale (*Stellaria holostea*), plescaita (*Myosoton aquaticum* sau *Stellaria aquatica*), pleșcaita (*Cucubalus bacifer*), grășătoarea (*Sagina nodosa*), *Chimaphila umbellata*, ruginarea (*Andromeda polifolia*), argințica (*Dryas octopetala*), roua-cerului (*Drosera rotundifolia* și *Drosera anglica* sau *Drosera longifolia*), șopârlaița-albă (*Parnassia palustris*), iarba-surzilor (*Saxifraga paniculata*), *Saxifraga stellaris*, *Saxifraga rotundifolia*, măciulia (*Thesium bavarum*), *Linnaea borealis*, cupa-vacii (*Convolvulus sepium* sau *Calystegia sepium*), zârna (*Solanum nigrum*), ciumăfaia (*Datura stramonium*), iarba-fiarelor (*Vincetoxicum officinale* sau *Vincetoxicum hircundinaria*), *Pseudorchis albida* sau *Gymngardenia albida* sau și *Leucorchis albida*, *Goodyera repens*, mlăștinița (*Epipactis palustris*), urzica-moartă (*Lamium album*), cătușnica (*Nepeta cataria*), busuiocul (*Ocimum basilicum*), sulfina-albă (*Melilotus albus*), luntricica (*Oxytropis campestris*), silurul (*Euphrasia officinalis*), coada-smeului (*Calla palustris*), iarba-roșie sau ardeiul-broaștei (*Polygonum persicaria*), iarba-roșie (*Polygonum lapathifolium*), iarba-șopârlelor (*Polygonum viviparum*), trifoiul-alb-târător (*Trifolium repens*), *Trifolium hybridum*, *Dorycnium germanicum*, *Orlaya grandiflora*, cucuta (*Conium maculatum*), dornicul (*Falcaria vulgaris*), mărărașul (*Oenanthe aquatica*), morcovul (*Daucus carota*), *Peucedanum ostruthium*, piciorul-caprei (*Aegopodium podagraria*), petrinjeii-de-câmp-mari (*Pimpinella major*), petrinjeii-de-câmp (*Pimpinella saxifraga*), costițelul (*Berula erecta*), brânca-ursului (*Heracleum sphondylium*), cucuta-de-apă (*Cicuta virosa*), *Torilis japonica* sau *Torilis rubella*, angelina-sălbatică (*Angelica sylvestris*), morcoveanca (*Pleurospermum austriacum*), zmeoaica (*Laserpitium latifolium*), *Laserpitium siler* sau *Siler montanum*, chimin-porcesc (*Peucedenum palustre*), *Crithmum maritimum*, ștevia (*Astrantia major*), cervana (*Lycopus europaeus*), romanița-de-câmp (*Anthemis arvensis*), *Anthemis austriaca*, *Tanacetum corymbosum* sau *Chrysanthemum corymbosum*, spilcuțele (*Tanacetum parthenicum* sau *Chrysanthemum parthenicum*), busuiocul-sălbatic (*Galinsoga parviflora*), margaretele (*Leucanthemum vulgare* sau *Chrysanthemum leucanthemum*), *Chrysanthemum atratum*, bătrânișul (*Conyza canadensis*), bunghișorul (*Erigeron annuus* sau *Stenactis annua*), bănuțeii (*Bellis perennis*), coada-șoricelului (*Achillea millefolium*), rotoțelele-albe (*Achillea ptarmica*),

turta (*Carlina acaulis*), albumița, floarea-de-colți, floarea-de-stâncă sau floarea-reginei (*Leontopodium alpinum*).

Plantele cu **flori galbene** care înfloresc în această lună sunt: coama-de-aur (*Aster linosyris*), sânzâienele-de-grădină (*Solidago canadensis*), cârligioarele (*Bidens cernua*), bătătornița (*Senecio erucifolius*) și *Hieracium sabaudum*. Rămân în floare rostopasca (*Chelidonium majus*), voinicica (*Sisymbrium* sau *Descurainia sophia*), muștarul-de-câmp (*Sinapis arvensis*), napii (*Brassica napus*), brăbinul (*Bunias orientalis*), puturoasa (*Diplotaxis tenuifolia*), *Erucastrum galicum*, ridichea-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), *Erysimum cheiranthoides*, boghița (*Rorippa silvestris*), brâncuța (*Rorippa palustris* sau *Rorippa islandica*), *Rapistrum rugosum*, brâncuța (*Sisymbrium officinale*), ciucușoara (*Alyssum alyssoides* sau *Alyssum calycinum*), ochelarița (*Biscutella laevigata*), *Draba aizoides*, ruja (*Sedum rosea* sau *Rhodiola rosea*), sclipeții (*Potentilla erecta*), sânzâienele (*Galium verum*), luminița (*Oenothera biennis* și *Oenothera glazioviana* sau *O. erythrosepala*), stergoaiă (*Veratrum album*), nufărul-galben (*Nuphar lutea*), *Ranunculus flammula*, *Ranunculus flammula reptans*, *Ranunculus lingua*, floarea-de-leac (*Ranunculus repens*), boglarii (*Ranunculus sceleratus*), piciorul-cocoșului (*Ranunculus acris*), *Ranunculus montanus*, *Hypericum humifusum*, sunătoarea sau pojarnița (*Hypericum perforatum*), *Hypericum hirsutum*, *Hypericum montanum*, iarba-osului (*Helianthemum nummularium*), *Fumana procumbens*, gălbinelele (*Lysimachia vulgaris*), *Lysimachia nemorum*, gălbăjoarele sau drețele (*Lysimachia nummularia*), plăcînțelele (*Geum reptans*), cernețelul (*Geum urbanum*), turița-mare (*Agrimonia eupatoria*), rumeneala (*Potentilla anglica*), cincidegete (*Potentilla reptans*), scrântitoarea (*Potentilla argentea*), sclipeții (*Potentilla aurea*), *Sedum reflexum* sau *Sedum rupestre*, *Saxifraga aizoides*, *Oxalis europaea* sau *Oxalis stricta* sau *Oxalis fontana*, ghințura-galbenă (*Gentiana lutea*), ghințura (*Gentiana punctata*), *Blackstonia perfoliata* sau *Chlora perfoliata*, somnoroasa sau lumânărica-peștilor (*Verbascum nigrum*), coada-vacii (*Verbascum thapsus*), coada-vacii (*Verbascum densiflorum* sau *Verbascum thapsiforme*), omagul (*Aconitum vulparia*), viorelele-de-ogoare (*Viola arvensis*), trei-frați-pătați (*Viola tricolor*), viorelele-galbene (*Viola biflora*), rechia (*Reseda lutea*), vătămatoarea (*Anthyllis vulneraria*), ghizdeiul (*Lotus corniculatus*), sulfina-galbenă (*Melilotus officinalis*), linteapratului (*Lathyrus pratensis*), drobița (*Genista tinctoria*), bobițelul sau lemnul-bobului (*Cytisus nigricans* sau *Lembotropis nigricans*), lucerna-galbenă (*Medicago falcata*), coșacii (*Astragalus cicer*), slăbănogul (*Impatiens noli-tangere*), *Impatiens parviflora*, *Melampyrum pratense*, sor-cu-frate (*Melampyrum nemorosum*), grâul-prepeliței sau miazănoaptea (*Melampyrum arvense*), avrămeasa (*Kickxia elatine*), clocoticiul (*Rhinanthus minor*), daria (*Pedicularis sceptrum-carolinum*), degețelul-galben (*Digitalis grandiflora* sau *Digitalis ambigua*), linarița (*Linaria vulgaris*), otrățelul (*Utricularia vulgaris*), tămâița-de-câmp (*Ajuga chamaepitys*), jaleșul-de-câmp (*Stachys recta*), sugărelul (*Teucrium montanum*), iarba-unsuroasă (*Teucrium scorodonium*), cinstețul sau coceanul-căpresc (*Salvia glutinosa*), cânepița (*Galeopsis speciosa*), rutișorul (*Thalictrum minus*), laptele-cucului (*Euphorbia helioscopia*), *Euphorbia paralias*, trifoiul-mărunt (*Medicago lupulina*), *Trifolium dubium* sau *Trifolium minus*, trifoiășul (*Trifolium campestre*), *Trifolium spadiceum*, mărarul (*Anethum graveolens*), păstârnacul (*Pastinaca sativa*), costișelul (*Sium latifolium*), *Silaum silaus*, urechea-iepurelui (*Bupleurum falcatum*), siminocul (*Helichrysum arenarium*), splinuța (*Solidago virgaurea*), vetricele (*Tanacetum vulgare* sau *Chrysanthemum vulgare*), *Chamomilla suaveolens* sau și *Matricaria suaveolens* sau *Matricaria discoidea*, punga-babei (*Pulicaria dysenterica*), floarea-de-perină (*Anthemis tinctoria*), cioroiul (*Inula salicina*), solovârvarița (*Inula britannica*), dentița (*Bidens tripartita*), cujda (*Doronicum grandiflorum*), *Senecio doronicum*, iarba-carelor (*Senecio aquaticus*), spălăcioasa (*Senecio vernalis*), *Senecio viscosus*, cruciulița (*Senecio vulgaris*), amărăciunea sau bășacănul (*Senecio fuchsii*), iarba-carelor (*Senecio erraticus*), capul-călugărului (*Leontodon autumnalis*), *Leontodon hispidus*, buruiana-porcească (*Hypochoeris radicata*), susaiul (*Sonchus arvensis*), susaiul-aspru (*Sonchus asper*), nilocea sau crăstăvalul (*Cirsium oleraceum*), scăișorul sau turta (*Carlina*

*vulgaris*), zgrăbunțica sau salata-cânelui (*Lapsana communis*), amăruța (*Picris hieracioides*), iarba-găinii (*Picris echioides* sau *Helminthotheca echioides*), *Crepis paludosa*, sălățița (*Aposeris foetida*), vulturica (*Hieracium pilosella*), rușulița (*Hieracium aurantiacum*), *Hieracium villosum*, vulturica (*Hieracium lachenalii*), *Hieracium murorum* sau *Hieracium sylvaticum*, plutica (*Nymphoides peltata* sau *Limnanthemum nymphoides*).

Tufe de *Solidago canadensis* – planta exotică invadatoare numită mai sus –, sunt foarte prezente și vizibile pe marginea drumurilor din județul Mureș.

Plantele cu **flori roșii, roz sau purpurii** care înfloresc acuma sunt: brândușa-de-toamnă (*Colchicum autumnale*), iarba-neagră sau mărățoaga (*Calluna vulgaris*), dințura (*Odontites rubra*). Rămân la vedere și în luna august frigurele (*Cardaminopsis arenosa*), răsgoacele sau zburătoarea (*Epilobium angustifolium* sau *Chamerion angustifolium*), pufulița (*Epilobium tetragonum* sau *Epilobium adnatum*, *Epilobium hirsutum* și *Epilobium montanum*), ruja (*Sedum rosea*), răchițelele (*Oxycoccus palustris* sau *Vaccinium oxycoccus*), *Allium vienale*, roșățeua sau crinul-de-baltă (*Butomus umbellatus*), cocoșei-de-câmp (*Adonis aestivalis*), vâlul-miresei (*Gypsophila muralis*), odogaciul sau săpunarița (*Saponaria officinalis*), *Petrorhagia saxifraga* sau *Tunica saxifraga* sau și *Kohlruschia saxifraga*, *Spergularia rubra*, *Spergularia media* sau *Spergularia maritima*, *Spergularia salina* sau *Spergularia marina*, iarba-roșioară (*Silene acaulis*), garofița sau vâzdoaga (*Dianthus carthusianorum*), garoafa (*Dianthus deltoides*), garoafa-de-munte (*Dianthus superbus*), nalba-mare (*Althaea officinalis*), *Malva moschata*, cașul-popii (*Malva neglecta*), nalba (*Malva sylvestris*), *Malva alcea*, scânteuța sau iarba-de-păsări (*Anagallis arvensis*), șerpărița (*Glaux maritima*), ciclamenul (*Cyclamen purpurascens* sau *Cyclamen europaeum*), verdeața-iernii (*Chimaphila umbellata* sau *Pyrola umbellata*), verzișoara-de-munte (*Sempervivum montanum*), urechelnița (*Sempervivum tectorum*), iarba-grasă (*Sedum telephium*), *Saxifraga aizoides*, ciocul-berzei (*Geranium lucidum*, *Geranium molle*, *Geranium dissectum*), năpraznica (*Geranium robertianum*), pliscul-cocorului (*Erodium cicutarium*), frigările (*Geranium palustre*), *Geranium sanguineum*, priboiul (*Geranium rotundifolium*), pliscarița (*Geranium pyrenaicum*), volbura (*Convolvulus arvensis*), fierea-pământului (*Centaurium erythraea* sau *Centaurium minus* sau și *Centaurium umbellatum*), miruța (*Anchusa officinalis*), *Epipogium aphyllum*, *Traunsteinera globosa* sau *Orchis globosa*, sângele-voinicului (*Nigritella nigra*), fumarița (*Fumaria officinalis*), *Lathyrus palustris*, bobul-de-țarină (*Lathyrus sylvestris*), oreșnița (*Lathyrus tuberosus*), coroniștea (*Coronilla varia*), dulcișorul (*Hedysarum hedysaroides*), osu-iepurelui (*Ononis spinosa*), slăbănogul-de-Himalaia (*Impatiens glandulifera*), răchitanul (*Lythrum salicaria*), grâul-prepeliței sau miazănoapte (*Melampyrum arvense*), daria (*Pedicularis rostratocapitata*), degețelul-roșu (*Digitalis purpurea*), sugel-puturos (*Lamium purpureum*), urzica-moartă (*Lamium maculatum*), *Galeopsis bifida*, fața-mâței (*Galeopsis angustifolia*), lungurica (*Galeopsis tetrahit*), talpa-gâștei (*Leonurus cardiaca*), crețișorul (*Betonica officinalis* sau *Stachis officinalis*), apăărătoarea (*Clinopodium vulgare* sau *Satureja vulgaris* sau și *Calamintha clinopodium*), cimbrul (*Satureja hortensis*), busuiocul (*Ocimum basilicum*) - bis, cătușele (*Ballota nigra*), bălbisa (*Stachis palustris*), sovârvul (*Origanum vulgare*), cătușnica (*Nepeta cataria*), dumbățul (*Teucrium chamaedrys*), cimbrisorul (*Thymus pulegioides* sau *Thymus ovatus*), *Allium carinatum*, aiul-sălbatic (*Allium oleraceum*), *Allium vienale*, ceapa-de-tuns (*Allium schoenoprasum*), *Allium rotundum*, iarba-roșie sau ardeiul-broaștei (*Polygonum persicaria*), iarba-roșie (*Polygonum lapathifolium*), buruiana-vermilor (*Polygonum mite*), sălcuța sau troscotul-de-baltă (*Polygonum amphibium*), bria sau brioala (*Ligusticum mutellina*), sângerica (*Sanguisorba officinalis*), *Armeria maritima*, trifoiul-roșu (*Trifolium pratense*), trifoiul (*Trifolium alpestre*), *Trifolium hybridum*, papanășii (*Trifolium arvense*), căpșunica (*Trifolium fragiferum*), odoleanul (*Valeriana officinalis*), torțelul (*Cuscuta europaea* și *Cuscuta epithimum*), izma-proastă (*Mentha arvensis*), izma (*Mentha longifolia*), izma-broaștei (*Mentha aquatica*), ciucurașii (*Adenostyles alliariae*), bănuțeii (*Bellis*

*perennis*), salata-iepurelui (*Prenanthes purpurea*), coada-șoricelului (*Achillea millefolium*) bis, cânepa-codrului (*Eupatorium cannabinum*), brusturele-de-munte (*Arctium tomentosum* sau *Lappa tomentosa*), albăstrița (*Centaurea jacea*), *Centaurea pseudophrygia*, sglăvocul (*Centaurea scabiosa*), ochiul-boului sau stelutele (*Erigeron alpinus*), rușulița (*Hieracium aurantiacum*), scaiul (*Cirsium vulgare*), captalanul (*Cirsium rivulare* sau *Cirsium salisburgense*), *Cirsium tuberosum* sau *Cirsium bulbosum*, crăpușnicul (*Cirsium helenioides* sau *Cirsium heterophyllum*), ciulinul (*Carduus nutans*), spinul (*Carduus acanthoides*), pălămida (*Carduus crispus*), *Carduus personata*, pălămida-seacă (*Cirsium arvense*), scaiul-măgăresc (*Onopordon acanthium*), gălbinarea (*Serratula tinctoria*)...

Dintre plantele cu **flori albastre, lila** sau **violet** care înfloresc în luna august sunt brândușa-de-toamnă (*Colchicum autumnale*) bis. Le regăsim în floare pe *Cakile maritima euxina*, *Sherardaria arvensis*, *Gentianella ciliata*, ventrilica (*Veronica officinalis* și *Veronica persica* sau *Veronica byzantina*), *Veronica fruticans*, *Veronica aphylla*, iarba-șarpelui (*Veronica latifolia*), *Veronica arvensis*, șopârlița (*Veronica serpyllifolia*), băieței sau buruienele-tunse (*Veronica spicata* sau *Pseudolysimachia spicata*), bobornicul (*Veronica beccabunga*), *Veronica anagallis-aquatica*, *Soldanella pusilla*, scânteuța sau iarba-de-păsări (*Anagallis arvensis*) bis, ineața (*Linum perenne*), greghetinul sau ciocul-berzei (*Geranium pratense*), cupele (*Gentiana clusii*), cupele-mari (*Gentiana kochiana*), ochincelele (*Gentiana verna* sau *Gentiana aestiva*), *Gentiana germanica* sau *Gentianella germanica*, lumânărica (*Gentiana asclepiadea*), ghințura sau ochinceaua (*Gentiana cruciata*), *Gentiana pannonica*, ghințura (*Gentiana pneumonanthe*), *Gentiana nivalis*, fierea-pământului (*Gentiana urticulosa*), volvaticul (*Swertia perennis*), limba-mielului (*Borago officinalis*), limba-boului (*Anchusa officinalis*), ochiul-lupului (*Anchusa arvensis* sau *Lycopsis arvensis*), lesniciorul (*Solanum dulcamara*), iarba-șarpelui sau viperina (*Echium vulgare*), nu-mă-uita (*Myosotis palustris*), ochiul-șarpelui (*Myosotis arvensis*), ochi-de-șarpe sau ochiul-șarpelui (*Erithrichium nanum*), bulbucii (*Campanula trachelium*), rânza (*Campanula rapunculoides*), albăstrica (*Campanula rotundifolia*), clopoței (*Campanula persicifolia*), *Campanula cochleariifolia* sau *Campanula pusilla*, ciucurele (*Campanula glomerata*), *Campanula scheuchzeri*, floarea-Sfintei-Vineri (*Legousia speculum-veneris*), nemțișorul-de-câmp (*Consolida regalis* sau *Delphinium consolida*), omagul (*Aconitum napellus*), *Aconitum variegatum paniculatum*, tri-frați-pătați sau barba-împăratului (*Viola tricolor*), costița (*Vicia hirsuta*), mazăroiul-sălbatic sau năutul-iepurelui (*Vicia sepium*), mazărichea (*Vicia cracca* și *Vicia dumetorum*), mazărichea-de-pădure (*Vicia sylvatica*), mazărichea-păroasă (*Vicia villosa*), lucerna (*Medicago sativa*), chitulușul (*Astragalus alpinus*), luntricica (*Oxytropis campestris*), *Oxytropis halleri*, *Cymbalaria muralis* sau *Linaria cymbalaria*, *Microrrhinum minus* sau *Chaenorhinum minus*, amăreala (*Polygala vulgaris*), iarba-șarpelui sau viperina (*Echium vulgare*) – bis, floarea-miresei sau beteala-miresei (*Cymbalaria muralis* sau *Linaria cymbalaria*), linarița-de-munte (*Linaria alpina*), bursuca (*Bartsia alpina*), avrămeasa (*Kickxia elatine*), iarba-neagră sau busuiocul-negru sau și coroabele (*Prunella grandiflora*), busuiocul-sălbatic (*Prunella vulgaris*), jaleșul-sălbatic sau iarba-Sfântului-Ion (*Salvia pratensis*), urechea-porcului (*Salvia verticillata*), cimbrul-mare-de-munte (*Acinos alpina* sau *Calamintha alpina*), vinerița sau tămâița sau și frunza-de-sub-tufă (*Ajuga reptans*), *Ajuga pyramidalis*, mirgăul (*Scutellaria galericulata*), levănțița (*Lavandula angustifolia* sau *Lavandula officinalis*), izmușoară-de-câmp (*Acinos arvensis* sau *Calamintha arvensis*), cânepița (*Galeopsis speciosa*) – bis, iarba-păduchilor sau bălbisa (*Stachys sylvatica*), sporiciul (*Verbena officinalis*), scaiul-ciobanului (*Dipsacus sylvestris*), ruinul sau floarea-văduvelor (*Succisa pratensis*), mușcatul-dracului sau ochiul-boului-vânăt (*Knautia arvensis*), mușcatul-dracului sau verzoasa (*Knautia silvatica*), mușcatul-dracului sau tătăișa-albă (*Scabiosa columbaria*), limba-peștelui (*Limonium vulgare* sau *Statice limonium*), *Jasione montana*, izma-proastă (*Mentha arvensis*), izma (*Mentha longifolia*), izma-broaștei (*Mentha aquatica*), pălămida (*Cirsium arvense*), vitrigonul (*Eryngium maritimum*), ochiul-boului (*Aster alpinus*), bunghișorul (*Erigeron annuus* și *Erigeron acris*), rotungioarele sau iarba-orbalțului

(*Homogyne alpina*), albăstrițele sau vinețelele (*Centaurea cyanus*), *Centaurea pseudophrygia*, *Centaurea jacea*, *Centaurea scabiosa*, *Cicerbita alpina* sau *Mulgedium alpinum*, cicoarea (*Cichorium intybus*). În sudul țării, zona Drăgășanului, se remarcă în această perioadă atârănătoarea sau ghețișoara sau și floarea-de-o-zi (*Commelina communis*), plantă ornamentală originară din estul Asiei, invazivă prin locurile umbrite din grădini, *Platycodon grandiflorum*, o plantă ornamentală adusă din Asia de Est.

Dintre plantele cu flori **verzi, brune** sau **nesemnificative** care înfloresc în luna august sunt: brânca sau iarba-sărată (*Salicornia europaea*), stelița-vânăță (*Aster amellus*) și le regăsim în floare pe: lipitoarea sau ciuma-apelor (*Elodea canadensis*), broscărița sau iarba-șerpilor (*Triglochin palustre*), *Triglochin maritimum*, broasca-apei sau limba-apei (*Potamogeton pusillus*, *Potamogeton perfoliatus* și *Potamogeton pectinatus*), *Potamogeton densus* sau *Groenlanda densa*, broasca-apei (*Potamogeton crispus*), broscărița (*Potamogeton natans*), *Potamogeton alpinus*, ața-de-mare (*Ruppia maritima*), iarba-de-mare (*Zostera marina*), mătrița (*Zannichellia palustris*), inarița-mare (*Najas marina*), șovarul (*Sparganium erectum* sau *Sparganium ramosum*), papura (*Typha latifolia*) bis, cosorul (*Ceratophyllum demersum* și *Ceratofillum submersum*), aiul-sălbatic (*Allium oleraceum*), mlăștinițele (*Epipactis atrorubens* sau *Epipactis rubiginosa* sau și *Epipactis atropurpurea*, *Epipactis helleborine* sau *Epipactis latifolia*, *Epipactis purpurata* sau *Epipactis sessilifolia* sau și *Epipactis violacea*, *Epipactis palustris*), buhaiul sau buhăieșul (*Listera cordata*), urzica-mare (*Urtica dioica*), parachernița (*Parietaria officinalis* sau *Parietaria erecta*), știrul (*Amaranthus retroflexus*), hameiul (*Humulus lupulus*), grășătoarea (*Sagina procumbens*), buruiana-surpăturii (*Scleranthus annuus*), feciorica (*Herniaria glabra*), căprița (*Atriplex litoralis*), loboda (*Atriplex patula* și *Atriplex hastata* sau *Atriplex prostrata*), iarba-de-sărătură (*Suaeda maritima*), săricica (*Salsola kali*), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), loboda sau spanacul-sălbatic (*Chenopodium album*), *Chenopodium polyspermum*, hrișca (*Fagopyrum esculentum* sau *Fagopyrum sagittatum*), hrișca-urcătoare (*Fallopia convolvulus* sau *Polygonum convolvulus*), măcrișelul (*Oxyria digyna*), troscotul (*Polygonum aviculare*), buruiana-viermilor (*Polygonum mite*), piperul-bălții (*Polygonum hidropiper*), *Rumex maritimus*, măcrișul-calului (*Rumex obtusifolius* și *Rumex conglomeratus*), dragaveiul (*Rumex crispus*), măcrișul-mărunt (*Rumex acetosella* sau *Acetosella vulgaris*), trepădătoarea (*Mercurialis annua*), aliorul sau laptele-cucului (*Euphorbia helioscopia*), laptele-câinelui (*Euphorbia peplus*), *Euphorbia paralias*, *Euphorbia exigua*, *Euphorbia humifusa* sau *Chamaesyce humifusa*, crețișoarele (*Aphanes arvensis*), crețișoara (*Alchemilla vulgaris*), cebarea sau boabele-de-vătămătură (*Sanguisorba minor*), cornaciul (*Trapa natans*), coada-mânzului (*Hippuris vulgaris*), penița sau mălura-bălții sau prâsnelul sau și brădișul-galben (*Myriophyllum spicatum* și *Myriophyllum verticillatum*), ochiul-lupului (*Nonea pulla*), mătrăguna (*Atropa belladonna*), măselarița sau nebunarița (*Hyoscyamus niger*), păpălăul (*Physalis alkekengi*), bubericul sau iarba-neagră (*Scrophularia nodosa*), iarba-neagră (*Scrophularia umbrosa*), verigelul (*Orobanche gracilis*), drențele (*Callitriche palustris*), chenarul-bălților (*Littorella uniflora*), pătlagina (*Plantago major*), pătlagina-îngustă (*Plantago lanceolata*), *Plantago maritima*, *Plantago coronopus*, floarea-patului (*Gnaphalium sylvaticum* sau *Omalotheca sylvatica*), *Gnaphalium uliginosum* sau *Filaginella uliginosa*, flocoșelele (*Filago arvensis*), pelinarița sau pelinul-negru (*Artemisia vulgaris*)...

**Gramineele și speciile asemănătoare lor** pe care le regăsim în floare în luna august sunt: papura (*Typha latifolia*), bucățelul (*Agrostis canina*), obsiga (*Bromus erectus*), păiușul (*Deschampsia flexuosa*), trestia-de-câmp (*Calamagrostis epigejos*), trestioara (*Calamagrostis varia*), păiușul (*Festuca ovina* și *Festuca gigantea*), flocoșica (*Holcus mollis* și *Holcus lanatus*), hirușorul (*Poa annua*), firușca-șopârlelor (*Poa alpina*), orzul-pădureț (*Elymus europaeus* sau *Hordelimum europaeus*), trestia sau stuful (*Phragmites australis* sau *Phragmites communis*), iarba-albastră (*Molinia caerulea*), mana-de-ape (*Glyceria maxima*), rourica (*Glyceria fluitans*), meișorul (*Digitaria sanguinalis* sau *Panicum sanguinalis*),

bărboasa (*Bothriochloa ischaemum* sau *Andropogon ischaemum*), mohorul, mohorul lat sau mohorul înalt (*Echinochloa crus-galli*), *Lolium multiflorum* sau *Lolium italicum*, pirul-târâtor (*Agropyron repens* sau *Elymus repens*), mohorul-verde (*Setaria viridis*), orzul-șoarecilor (*Hordeum murinum*), timoftica (*Phleum pratense*), coada-vulpiei (*Alopecurus geniculatus*), poponetele (*Alopecurus aequalis*), *Ammophila arenaria*, perișorul (*Elymus giganteus* sau *Elymus arenarius* sau și *Leymus arenarius*), pirul-de-mare (*Elymus farctus* sau *Agropyron junceum*), bumbăcarița (*Eriophorum scheuchzeri*), *Rhynchospora alba*, pipiriguțul (*Eleocharis palustris* și *Eleocharis acicularis*), rogozul sau șovarul (*Bolboschoenus maritimus* sau *Scirpus maritimus*), țipirigul (*Scirpoides holoschoenus* sau *Holoschoenus romanus* sau și *Holoschoenus vulgaris*), *Isolepis setacea* sau *Scirpus setaceus*, *Blysmus compressus*, rogozul (*Carex bohemica* sau *Carex cyperoides*, *Carex curvula*, *Carex flava*, *Carex firma*, *Carex sempervirens*, *Carex ferruginea*, pipirigul-american (*Juncus tenuis*), *Juncus inflexus*, pipirigul-de-pădure (*Juncus acutiflorus*), speteaza (*Juncus effusus*), *Juncus filiformis*, părul-porcului (*Juncus trifidus*), iarba-broaștei sau iarba-bivolului (*Juncus bufonius*), *Juncus bulbosus* sau *Juncus supinus*, broscărița sau iarba-șerpilor (*Triglochin palustre*).

Dintre **arbuștii** care încep să înflorească în luna august amintim iedera-zânelor (*Hedera helix*), iar printre cei aflați în floare sunt următorii: cătina-mică (*Myricaria germanica*), cătina-roșie (*Tamarix gallica*), *Rubus fruticosus*, bășicoasa (*Colutea arborescens*), *Salix reticulata*, tămâița (*Daphne cneorum*), iarba-neagră sau mărtăloaga (*Calluna vulgaris*) bis, merișorul (*Vaccinium vitis-idaea*), *Loiseleuria procumbens*, *Potentilla fruticosa*. Fructele tulichinei sau liliacului-de-pădure (*Daphne mezereum*) sunt dispersate de păsări după această lună. Pentru *Salix retusa* august este ultima lună de înflorire. Teiul-pucios (*Tilia cordata* sau *Tilia parvifolia*) și teiul (*Tilia platyphyllos* sau *Tilia grandifolia*) își păstrează ultimile flori până spre mijlocul lunii. Continuă diseminarea semințelor de mesteacăn (*Betula pendula*), cireș (*Prunus avium* sau *Cerasus avium*), salcâm (*Robinia pseudoacacia*). Scorușul-păsăresc (*Sorbus aucuparia*) oferă fructe mierlelor, sturzilor și altor păsări. La arborii de castan-porcesc (*Aesculus hippocastanum*) încep să li se îngălbenească frunzele de pe la jumătatea lunii. Acest lucru se datorează larvei unei fluturi numit molia-minieră-a-frunzelor-de-castan (*Cameraria ohridella*) semnalat în România din anul 1989. Duglasul (*Pseudotsuga menziesii*) diseminează pe la sfârșitul lunii. Începe și maturizarea fructelor de păducel (*Crataegus monogyna*), de soc (*Sambucus nigra*) și de călin (*Viburnum opulus*).

**Alte aspecte:** Viziunea și percepția noastră asupra culorilor diferă de la o persoană la alta. De asemenea, culorile florilor variază funcție de umbră și de lumină, gradul de maturizare, tipul de sol, acid sau bazic. În final, florile sunt unele dintre cele mai frumoase componente vii ale mediului înconjurător.

În luna august, către sfârșitul verii, lujerii anuali ai arborilor se lignifică și formează muguri (cf. fr. *aoûter*, *aoûtement*).

În această perioadă se pot consuma următoarele părți de plante:

**Frunzele** tinere de urzică-mare (*Urtica dioica*), lobodă (*Atriplex patula*), lobodă sau spanac-sălbatic (*Chenopodium album*), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), știrul-aspru sau știrul-porcesc (*Amaranthus retroflexus*), măcrișel (*Oxyria digyna*), răculeț (*Polygonum bistorta*), hrișcă-urcătoare (*Polygonum convolvulus*), piperul-bălții (*Polygonum hydropiper*), măcrișul (*Rumex acetosa*), stegie (*Rumex alpinus*), nalbă (*Malva sylvestris*), micșunele sau toporași (*Viola odorata*), hrean (*Armoracia rusticana*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), *Cakile maritima euxina* - în Dobrogea, traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), hrenoasă (*Lepidium latifolium*), boghiță sau hrean-sălbatic (*Rorippa sylvestris*), muștar-de-câmp (*Sinapis arvensis* sau *Brassica arvensis*), iarbă-roșie sau

buruiana-viermelui (*Thlaspi arvense*), rechia sau poala-Sfintei-Mării (*Reseda lutea*), strugurii-ursului (*Arctostaphylos uvaursi*), *Sedum reflexum* sau *Sedum rupestre*, crețșoară (*Alchemilla vulgaris*), fragi (*Fragaria vesca*), cebărea (*Sanguisorba minor*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), trifoi-roșu (*Trifolium pratense*), pufuliță sau bisacăn (*Epilobium angustifolium*), măcrișul-iepurelui (*Oxalis acetosella*), piciorul-caprei (*Aegopodium podagraria*), angelină-sălbatică (*Angelica sylvestris*), chimen (*Carum carvi*), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (*Foeniculum vulgare*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), păstârnac (*Pastinaca sativa*), *Peucedanum ostruthium*, limba-mielului sau otrățel (*Borago officinalis*), plumânărică sau mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), tătăneasă (*Symphytum officinale*), urzică-moartă (*Lamium album*), levănțică (*Lavandula angustifolia*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), mentă-sălbatică (*Mentha arvensis*), cătușnică sau iarbă-flocoasă sau și iarba-măței (*Nepeta cataria*), sovârv (*Origanum vulgare*), bălbisă sau iarba-păduchilor sau și jale (*Stachys sylvatica*), cimbrisor (*Thymus serpyllum*), pătlagină-mare (*Plantago major*), cărbuni sau pușca-dracului (*Phyteuma spicatum*), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (*Apoeris foetida*), susai-de-pădure (*Mycelis muralis* sau *Lactuca muralis*), susai (*Sonchus oleraceus*), păpădie (*Taraxacum officinale*), bănuței sau părăluțe (*Bellis perennis*), scai-gălbincios sau nilocea sau și crăstăval (*Cirsium oleraceum*), captalan sau brusture (*Petasites hybridus*) – pețiolul frunzelor, lemnul-Maicii-Domnului (*Santolina chamaecyparissus*), vetrice sau călăpăr (*Tanacetum vulgare*) – cu prudență, planta fiind puțin toxică –, podbal sau gălbenele (*Tussilago farfara*), *Allium vineale*...

**Plantele**, respectiv **tijele** tinere de paracherniță (*Parietaria officinalis*), rocoină (*Stellaria media*), iarbă-grasă sau grașiță (*Portulaca oleracea sylvestris*), iarbă-sărată sau brâncă (*Salicornia europaea*), năsturel (*Nasturtium officinale*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), bălbisă, iarba-păduchilor sau jale (*Stachys sylvatica*), bobornic (*Veronica beccabunga*), susai (*Sonchus oleraceus*), buruiana-cătanelor (*Galinsoga parviflora*), trestie sau stof (*Phragmites australis*)...

**Rădăcinile** (sau după caz, **rizomii**, **tuberculi**, **bulbii**) de ferigă-de-câmp (*Pteridium aquilinum*), răculeț (*Polygonum bistorta*), hrean (*Armoracia rusticana*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), hrenoasă (*Lepidium latifolium*), cernețel sau rădichioară (*Geum urbanum*), coada-racului sau argentină (*Potentilla anserina*), cărbuni (*Phyteuma spicatum*), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (*Apoeris foetida*), păpădie (*Taraxacum officinale*), iarbă-mare (*Inula helenium*), pir-târâtor (*Elymus repens*), *Allium vineale*...

**Florile** de mac (*Papaver rhoeas*), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), nalbă (*Malva sylvestris*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), ridiche-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), boghiță sau hrean-sălbatic (*Rorippa sylvestris*), rechia sau poala-Sfintei-Mării (*Reseda lutea*), crețșoară (*Filipendula ulmaria*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), trifoi-roșu (*Trifolium pratense*), pufuliță sau bisacăn (*Epilobium angustifolium*), angelină-sălbatică (*Angelica sylvestris*), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (*Foeniculum vulgare*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), limba-mielului sau otrățel (*Borago officinalis*), plumânărică sau mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), isop (*Hyssopus officinalis*), urzică-moartă (*Lamium album*), levănțică (*Lavandula angustifolia*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), mentă-sălbatică (*Mentha arvensis*), cătușnică sau iarbă-flocoasă sau și iarba-măței (*Nepeta cataria*), sovârv (*Origanum vulgare*), cimbrisor (*Thymus serpyllum*), clopoței (*Campanula rapunculus*), odolean, iarba-pisicii (*Valeriana officinalis*), răsfug (*Chondrilla juncea*), păpădie (*Taraxacum officinale*), țâța-caprei (*Tragopogon pratensis*), bănuței sau părăluțe (*Bellis perennis*), filimică (*Calendula arvensis*), mușetel (*Matricaria suaveolens* sau *Matricaria discoidea* sau și *Chamomilla suaveolens*), crăpușnic

sau scai-lânos (*Cirsium eriophorum*) – atenție la înțepături în timpul culesului, scai-gălbincios sau nilocea sau și crăstăval (*Cirsium oleraceum*), margaretă (*Leucanthemum vulgare*), lemnul-Maicii-Domnului (*Santolina chamaecyparissus*), armurariu (*Silybum marianum*), podbal sau gălbenele (*Tussilago farfara*), vetrice sau călăpăr (*Tanacetum vulgare*) – cu prudență, planta fiind puțin toxică...

**Fructele (conurile, semințele)** de ienupăr (*Juniperus communis*), mac (*Papaver rhoeas*), lobodă sau spanacul-sălbatic (*Chenopodium album*), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), știrul-aspru sau știrul-porcesc (*Amaranthus retroflexus*), hrișcă-urcătoare (*Polygonum convolvulus*), piperul-bălții (*Polygonum hydropiper*), nalbă (*Malva sylvestris*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), hrenoasă (*Lepidium latifolium*), ridiche-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), muștar-de-câmp (*Sinapis arvensis* sau *Brassica arvensis*), iarbă-roșie sau buruiana-viermelui (*Thlaspi arvense*), strugurii-ursului (*Arctostaphylos uvaursi*), afin (*Vaccinium myrtillus*), răchițele (*Oxycoccus palustris* sau *Vaccinium oxycoccus*), agriș (*Ribes uva-crispa*), păr-sălbatic (*Amelanchier ovalis*), păducel (*Crataegus laevigata*), fragi (*Fragaria vesca*), bob-de-țarină sau mazăriche (*Lathyrus sylvestris*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), mazărichea-de-primăvară (*Vicia sativa nigra*), cătină-albă (*Hippophaë rhamnoides*), angelină-sălbatică (*Angelica sylvestris*), morcov-sălbatic (*Daucus carota*), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (*Foeniculum vulgare*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), păstârnac (*Pastinaca sativa*), *Peucedanum ostruthium*, păpălău sau gogoși (*Physalis alkekengi*), turiță (*Galium apparine*), soc-roșu (*Sambucus racemosa*), călin (*Viburnum opulus*) – cu prudență, la maturitate, *Aegilops geniculata* sau *Aegilops ovata*, odos (*Avena fatua*), meișor (*Digitaria sanguinalis*), pir-târâtor (*Elymus repens*), rourică (*Glyceria fluitans*), orzul-șoarecilor (*Hordeum murinum*), mohor-verde (*Setaria viridis*)...

### **Insecte:**

Până pe la sfârșitul lunii buburuzele (*Coccinella septempunctata*) se hrănesc cu pureci de plante după care trec la nectarul florilor de vetrice (*Tanacetum vulgare*).

### **Pești :**

Pescuitul este permis pentru toate speciile de pești din apele de șes, colinare și de munte. În această lună sunt bune rezultatele la crap (*Cyprinus carpio*), somn (*Silurus glanis*), șalău (*Lucioperca lucioperca*), avat (*Aspius aspius*), mreană (*Barbus barbus*), mai ales la Dunăre.

### **Păsări:**

Presura-galbenă (*Emberiza citrinella*) continuă să cânte și acuma, când majoritatea păsărilor au amuțit, căutând grăunțe și boabe la sol. Berzele (*Ciconia ciconia*) și prigoriile (*Merops apiaster*) încep din această lună să se întoarcă spre Sudul Africii. Grupuri de prigorii, rar câte una singură, pot fi auzite și observate mai ales seara prin zonele însorite și deschise din vestul orașului Drăgășani, prinzând insectele din zbor, la înălțime. În aceleași perimetre formate din câmpuri, vii, pajiști, pășuni păscute, grădini și hududoaie, în posturi de observație de pe stâlpi, apare la vedere cucuveaua (*Athene noctua*). La râul Olt, se poate observa uneori printre păpurișuri, discretul, imobilul buhai-de-baltă (*Botaurus stellaris*).

**Alte aspecte.** Uliul-păsărar (*Accipiter nisus*): puii care au patru săptămâni, au învățat să zboare și să sfășie prada pe care părinții o aduc la cuib. Huhurezul-mic (*Strix aluco*): puii sunt independenți și își caută un teritoriu neocupat, ajungând uneori și până la două sute de



kilometri față de locul în care s-au născut, pentru a realiza acest lucru, mortalitatea rămânând în această perioadă foarte ridicată din această cauză. Cucul (*Cuculus canorus*): după o creștere rapidă puiul învață să zboare părăsind cuibul, însă tot părinții adoptivi îi aduc insectele. Astfel, când piuie ca să primească hrană atrage câteodată și prădătorii din jur. Ciocănitorea-pestriță-mare (*Dendrocopos major*): caută insecte, apărându-și cu îndârjire teritoriul, netolerând alți indivizi în zonă, nici măcar proprii pui. Gaița (*Garrulus glandarius*): mănâncă acuma și insecte mari. Pițigoiiul-mare (*Parus major*): indivizii s-au împrăștiat pentru a căuta fiecare pe cont propriu insectele, în această privință fiind foarte activi. Țicleanul (*Sitta europaea*): familiile se despart. Pănțarușul sau ochiuboului (*Troglodytes troglodytes*): puii în vârstă de două-trei săptămâni părăsesc cuibul iar masculul se ocupă de ei câteva zile păzindu-i, procurându-le insecte și găsimdu-le adăpost peste noapte. Muscarul-gulerat (*Ficedula albicollis*): toți membrii familiei hoinăresc prin pădure căutând insecte fără încetare. Măcăleandrul (*Erithacus rubecula*): familiile se separă iar indivizii năpârliți stau tăcuți prin tufișuri, la fel ca la silvia-cu-cap-negru (*Sylvia atricapilla*) camuflată de frunziș. Mierla (*Turdus merula*): apărarea teritoriului și cântecul încetează, căutarea hranei rămânând preocuparea principală. Pitulicea-fluierătoare (*Phylloscopus trochilus*): hoinărește în afara pădurii, prin grădini și livezi. Puii se recunosc acuma după abdomenul lor galben. Unele grupuri migrează. Fâsa-de-pădure (*Anthus trivialis*): ambii părinți le aduc insecte puilor din seria a doua, mai întâi apropiindu-se de cuib, așezându-se pe vârful unui arbore ca să inspecteze de acolo împrejurimile. Graurul (*Sturnus vulgaris*): puii se strâng în stoluri din ce în ce mai mari, care caută hrană diversă. Seara dorm împreună. Forfecuța (*Loxia curvirostra*): consumă, când semințele coniferelor sunt prea puține, fructe de scoruș-păsăresc. Botgrosul (*Coccothraustes coccothraustes*): se grupează la sursele de hrană precum cireșele la care, cu ciocul lui puternic, le sparge sâmburii pentru a consuma doar miezul acestora. Cinteza (*Fringilla coelebs*): familiile se separă, masculii nu mai cântă iar teritoriile rămân abandonate. Porumbelul-gulerat (*Columba palumbus*): în perioada seceratului, atât adulții cât și puii, culeg boabe de cereale de pe câmpuri. Cocoșul-de-munte (*Tetrao urogallus*): consumă multe fructe, în principal afinele. Înghite, de asemenea, petricele – *gastroliți* – care, după ce ajung în gușă, îl ajută la măcinarea alimentelor. Ierunca (*Bonasa bonasia*): când puii împlinesc trei săptămâni se pot cațara pe ramuri, având astfel refugii mai puțin accesibile pentru prădători.<sup>1</sup>

**Altceva:** Se vânează cioara-grivă (*Corvus corone cornix*), cioara-grivă-sudică (*Corvus corone sardonius*), cioara-de-semănătură (*Corvus frugilegus*), cioara-neagră (*Corvus corone corone*), stăncuța (*Corvus monedula*), coțofana (*Pica pica*), ciocârlia-de-câmp (*Alauda arvensis*), porumbelul-gulerat (*Columba palumbus*), porumbelul-de-scorbură (*Columba oenas*), prepelița (*Coturnix coturnix*), turturica (*Streptopelia turtur*) guguștiucul (*Streptopelia decaocto*) - aceste ultime 6 specii de mai sus începând cu data de 15 august.<sup>2</sup>

## Mamifere:

Puiul liliacului-de-seară (*Nyctalus noctula*) învață repede: la șase săptămâni poate zbura și captura insecte, consumând zilnic o treime din greutatea sa, acumulând rezervele de grăsime necesare în vederea hibernării. Noaptea puii liliacului-urecheat (*Plectorus auritus*)

<sup>1</sup> Cf. Christiane Haguenaer – *Les oiseaux et la forêt*, Delachaux et Niestlé, Paris, 1997

<sup>2</sup> Cf. [www.vanatoare-vanator.ro](http://www.vanatoare-vanator.ro)

rămân în creșa coloniei, în timp ce părinții lor vânează. Se înghesuie unii în alții suspențați de pereți, mamele recunoscându-i la întoarcere, pentru alăptare, doar după miros și strigăt.

Perioada de împerechere a jderului-de-copac (*Martes martes*) și a celui de piatră (*Martes foina*) continuă. La fel la căprior (*Capreolus capreolus*), iepure (*Lepus europaeus*), iepure-de-vizuină (*Oryctolagus cuniculus*), nutrie (*Myocastor coypus*), bizam (*Ondatra zibethicus*) și viezure (*Meles meles*). Zimbrul (*Bison bonasus*) se grupează și el în rezervații pentru rut. Continuă fătările la iepuri, bizam și viezure.

Mistrețului (*Sus scrofa*) îi năpârlește coama în această lună, iar capra-neagră (*Rupicapra rupicapra*) are acum blană de culoare cenușie. După jumătatea lunii marmota (*Marmota marmota*) adună iarbă pentru culcușul de iarnă.

**Alte aspecte:** Se vânează căpriorul (*Capreolus capreolus*) - însă numai exemplare masculine, mistrețul (*Sus scrofa*), șacalul (*Canis aureus*), vulpea (*Vulpes vulpes*), viezurele (*Meles meles*) - acesta din urmă cu începere de la 15 august.<sup>3</sup>

**Corolar:** În decursul lunii august durata zilei scade la Năsăud (47° 17' N, 24° 24' E) cu circa o oră și jumătate, astfel: cu 16 minute în prima săptămână - aceasta fiind incompletă, cu 21 minute în săptămâna a doua, cu câte 22 minute în săptămâna a treia și a patra, cu 10 minute în săptămâna a 5-a, de asemenea, incompletă.

Gavrilă Neamț - EUROPEA ROMANIA

---

<sup>3</sup> Cf. [www.vanatoare-vanator.ro](http://www.vanatoare-vanator.ro)