

Ce se poate observa pe teren în luna iunie - repere

Lună dedicată de calendarul roman lui *Junius Brutus*, prim consul al Romei. Popular se cheamă *cireșar*. E sub semnul solstițiului de vară, la 21 iunie fiind cea mai lungă zi din an.

Ciuperci comestibile:

Drelele (*Auricularia mesenterica*), buretele-de-soc sau urechea-ludei, urechiușele (*Auricularia auricula*), urechea-nucului sau păstrăvul, păstrăvul-de-nuc, ciuperca-păstrăv, buretele-păstrăv (*Polyporus squamosus*), bureții-galbeni sau gălbinelele, urechea-caprei, cigamică, ciuciuleții, gălbiorii, bureții-gălbiori, urechiușele (*Cantharellus cibarius*; a nu se confunda cu *Omphalotus olearius*), păstrăvul-scailor (*Pleurotus eryngii*), păstrăvul-de-fag sau păstrăvul, buretele-negru, găinușa-pădurii, păstrăvul-cerbului, negrișorii, bureții-de-fag, păstrăvul-vânăț (*Pleurotus ostreatus*; apare mai rar vara), *Hygrocybe conica*, usturoiașii (*Mariasmus alliaceus*), bureții-de-rouă sau ciocârlia, bureciorii, bureții-de-pajiște, ghebele-de-luncă (*Mariasmus oreades*; poate fi confundată cu *Inocybe fastigiata*), cocârții sau bureciorii, usturoiașii (*Mariasmus scorodonius*), pâlnia-brumată (*Laccaria amethystina*), *Laccaria laccata*, pâlnioara (*Clitocybe infunibuliformis*), *Clitocybe gibba*, ghebele sau ghebele-de-rădăcină, opinticii, halimașul (*Armillariella mellea*), *Collybia dryophila*, ghebele-de-stejar (*Collybia fusipes*), buretele-de-mai sau nicoretele, buretele-de-spin, ciuperca-lui-Sf.-Gheorghe (*Calocybe gambosa*), *Melanoleuca evenosa*, *Melanoleuca brevipes*, *Melanoleuca melaleuca*, *Melanoleuca grammopodia*, nicoretele sau sălcioara, nicoreții, buretele-de-mușchi (*Clitopilus prunulus*), cucii (*Amanita rubescens*), *Volvariella bombycina*, *Volvariella speciosa*, ciuperca-de-paie (*Volvariella volvacea*), buretele-cerbilor sau popincii, ciuperca-cerbilor (*Pluteus cervinus*), *Pluteus pellitus*, *Pluteus salicinus*, *Pluteus atromarginatus*, *Pluteus leoninus*, *Pluteus curtissi*, ciuperca-de-cultură sau ciuperca-de-strat-albă, crem sau brună, ciuperca-de-bălegar, champignonul (*Agaricus bisporus*), ciuperca-albă-termofilă (*Agaricus bitorquis*), ciuperca-de-câmp sau ciuperca-de-braniște, ciuperca, ciuperca-oilor (*Agaricus arvensis*), ciuperca-albă sau ciuperca-de-bălegar, ciuperca-de-gunoi, ciuperca, nane, ciuperca-de-câmp (*Agaricus campestris*), ciuperca-de-pădure (*Agaricus silvicola* și *Agaricus vaporarius*), buretele-cu-perucă sau bureții-popenchi, căciula-șarpelui (*Coprinus comatus*), popenchi sau buretele-de-cerneală (*Coprinus atramentarius*), bureciorii-de-rouă sau buretele-de-rouă (*Coprinus micaceus*), *Agrocybe aegerita*, *Agrocybe praecox*, popincii sau gheba-ciobanilor (*Pholiota mutabilis*), bureții-de-prun (*Rhodophyllus prunuloides*), turta-vacii sau văcuțele (*Boletus luteus*), mânătarca (*Boletus pinicola*), *Boletus appendiculatus*, mânătarca (*Boletus reticulatus*), pitoașca (*Boletus granulatus*), pitărcuța (*Boletus aurantiacus*), buretele-cu-picior-roșu (*Boletus erythropus*), *Boletus fechtneri*, hribul-murg (*Boletus badius*), chitarca sau pitarca-de-mesteacăn, pitarca, buretele-de-mesteacăn, mitarca-grasă, buretele-călugăresc (*Boletus scaber*), *Boletus aeruginascens*, *Boletus crocipodius*, *Boletus rubellus*, *Russula paludosa*, pânișoara (*Russula alutacea*), *Russula nauseosa*, gogoașe sau prăhăița-neagră, zburătoarea-cenușie (*Bovista nigrescens*), urechea-babei sau urechiușa, urechiuși (*Aleuria aurantia*), urechiușa (*Peziza badia*), zbârciogul sau ciuciuleții, ciuciuletele, pupii, ciuciuletele-de-mai (*Morchella esculenta*), ciuciuletele-gras (*Morchella crassipes*)...

Ciuperci toxice:

Inocybe patouillardi, *Inocybe fastigiata*, ciuperca-pieptănușului (*Entoloma lividum*), buretele-bălos sau băloșelul (*Russula foetens*), *Agaricus semilanceatus*, gheba-pucioasă (*Hypholoma fasciculare*), bureții-porcești (*Paxillus involutus*), *Rhodophyllus staurosporus*...

Plante cu flori:

Circa 60 % din speciile spontane sunt acum în floare. Dintre plantele cu **flori albe** care încep să înflorească în această lună amintim: săgeata-apei (*Sagittaria sagittifolia*), limbarița (*Alisma plantago-aquatica* sau *Alisma plantago*), iarba-broaștelor (*Hydrocharis morsus-ranae*), ciucușoara (*Berteroa incanana* sau *Farsetia inca*), *Asperula cynanchica*, *Galium boreale*, *Galium sylvaticum*, lipicioasa sau turița (*Galium aparine*), sânzienele (*Galium rotundifolium*), măciulia (*Thesium alpinum* și *Thesium bavarum*), tilișca (*Circaea alpina* și *Circaea lutetiana*), liliuța (*Anthericum ramosum*), stergoia (*Veratrum album*), nufărul-alb (*Nymphaea alba*), *Ranunculus fluitans* sau *Batrachium fluitans*, sisineii-de-munte (*Pulsatilla alba*), hrana-vacii (*Spergula arvensis*), săpunarița sau odogaciul (*Saponaria officinalis*), iarba-moale (*Stellaria holostea*), *Stellaria alsine* sau *Stellaria uliginosa*, plescaita (*Myosoton aquaticum* sau *Malachium aquaticum* sau și *Stellaria aquatica*), grășătoarea (*Sagina nodosa*), mutătoarea (*Bryonia alba*), perișorul (*Pyrola rotundifolia* și *Pyrola minor*), luminoasa (*Pyrola secunda* sau *Orthilia secunda* sau și *Ramischia secunda*), crețușca (*Filipendula ulmaria* sau *Spiraea ulmaria*), iarba-faptului sau oloisa (*Sedum album*), *Saxifraga stellaris*, *Saxifraga rotundifolia*, inuțul-de-câmp (*Linum catharticum*), gronovul (*Linnaea borealis*), cupa-vacii (*Calystegia sepium* sau *Convolvulus sepium*), zârna (*Solanum nigrum*), ciumăfaia sau bolundarița sau și laurul (*Datura stramonium*), *Pseudochoris albida* sau *Gymnadenia albida* sau și *Leuchorchis albida*), mlăștinița (*Epipactis palustris*), cătușnica (*Nepeta cataria*), busuiocul (*Ocimum basilicum*), sulfina-albă sau molotrul (*Melilotus albus*), trifoiul (*Trifolium ornithopodioides* sau *Trigonella ornithopodioides*), iarba-șopârlelor (*Polygonum viviparium*), cucuta sau bucinișul (*Conium maculatum*), mărărașul (*Oenanthe aquatica*), aluna-de-pământ (*Oenanthe fistulosa*), morcovul (*Daucus carota*), piciorul-caprei (*Aegopodium podagraria*), pătrunjii-de-câmp (*Pimpinella major*), brânca-ursului sau crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), hațmațuchiul-măgarului (*Torilis japonica* sau *Torilis anthriscus*), brioala sau mărarul-ursului (*Ligusticum mutellina*), baraboi (*Chaerophyllum bulbosum*), *Chaerophyllum aureum*, morcoveanca (*Pleurospermum austriacum*), *Laserpitium siler*, sânșoara (*Sanicula europaea*), *Tanacetum corymbosum* sau *Chrysanthemum corymbosum*, ochiul-boului sau margarete (*Leucanthemum vulgare* sau *Chrysanthemum leucanthemum*), bunghișorul (*Erigeron annuus* sau *Stenactis annua*), coada-șoricelului (*Achillea millefolium*)... Dintre plantele cu flori albe pe care le regăsim înflorite în iunie numim aici: foarfeca-bălții (*Stratiotes aloides*), urda-vacii sau hrenița (*Cardaria draba* sau *Lepidium draba*), iarba-roșie sau buruiana-viermelui (*Thlaspi arvense*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), lilicele sau pelinul-bun (*Iberis amara*), ridichea-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), hreanul (*Armoracia rusticana* sau *Armoracia lapathifolia*), gâscărița (*Arabis hirsuta*), turiceaua (*Arabis glabra* sau *Turritis glabra*), lopăteaua sau pana-zburătorului (*Lunaria rediviva*), năsturelul (*Nasturtium officinale*), frigurelele (*Cardaminopsis arenosa*), sânzâienele-albe (*Galium mollugo*), *Galium palustre*, *Galium glaucum* sau *Asperula glauca*, luminoasa (*Clematis recta*), clintița (*Ranunculus circinatus* sau *Batrachium circinatum*), *Ranunculus trichophyllus*, oițele sau omeluțele (*Anemone narcissiflora*), gușa-porumbelului (*Silene vulgaris* sau *Silene cucubalus* sau și *Silene inflata*), lichitoarea-păsărească (*Silene nutans*), *Gypsophila repens*, studenița (*Arenaria serpyllifolia*), cornuțul (*Cerastium arvense*), struna-cocoșului (*Cerastium holosteoides* sau *Cerastium caespitosum*), steluța (*Stellaria nemorum*), rocoina sau scânteuța (*Stellaria media*), merinana (*Moehringia trinervia*), ruginarea (*Andromeda polifolia*), laptele-stâncilor (*Androsace lactea*), *Trientalis europaea*, argințița (*Dryas octopetala*), aglica sau feriga-alba (*Filipendula vulgaris* sau *Filipendula hexapetala*), *Potentilla rupestris*, iarba-surzilor (*Saxifraga paniculata* sau *Saxifraga aizoon*), măciulia (*Thesium rostratum*), meiul-păsăresc sau grăușorul-vrabiei (*Lithospermum officinale*), iarba-fiarelor sau brilioanca (*Cynanchum vincetoxicum* sau *Vincetoxicum officinale*), stupinița (*Platanthera bifolia*), dumbravnica (*Melittis melissophyllum*), urzica-moartă (*Lamium album*), silurul (*Euphrasia officinalis*), foaia-grasă (*Pinguicula alpina*), coada-smeului (*Calla palustris*), barba-popii (*Aruncus sylvestris* sau *Aruncus vulgaris* sau și *Aruncus dioicus*), cărbunii sau cărbunarii (*Phyteuma spicatum*), trifoiul-alb (*Trifolium repens* și *Trifolium*

montanum), trifoiul (*Trifolium hybridum*), rușinatoarea sau rușinea-fetei (*Caucalis platycarpus* sau *Caucalis lappula* sau și *Caucalis daucoides*), patlagina (*Plantago media*), pătlagina sau iarba-de-cale (*Plantago major*), romanița-de-câmp (*Anthemis arvensis*), mușetelul (*Chamomilla recutita* sau *Matricaria chamomilla*), busuiocul-sălbatic sau buruiana-cătanelor sau și rocoina (*Galinsoga parviflora* sau *Galinsoga quinqueradiata*), spilcuțele (*Tanacetum parthenium* sau și *Chrysanthemum parthenium*), bănuțeii (*Bellis perennis*)... Iunie reprezintă ultima lună în care mai rămân în floare specii cu petale albe precum lăcrămița (*Maianthemum bifolium*), hrenița (*Lepidium campestre*), tășculița (*Aethioneuma saxatile*), găscarița (*Arabidopsis thaliana* și *Arabis turrita*), răjnica (*Cardamine hirsuta*), stupitul-cucului (*Cardamine pratensis*), usturoița (*Alliaria petiolata* sau *Alliaria officinalis*), vinarița (*Galium odoratum* sau *Asperula odorata*), coada-cocoșului sau pecetea-lui-Solomon (*Polygonatum odoratum* sau *Polygonatum officinale* și *Polygonatum multiflorum* dar și *Polygonatum verticillatum*), leurda (*Allium ursinum*), *Anthericum liliago*, lăcrimioarele sau mărăgăritărelul (*Convallaria majalis*), oițele (*Anemone sylvestris*), dediteii sau sisineii (*Pulsatilla vernalis*), rocoțeaua (*Stellaria graminea*), *Spergula morisonii* sau *Spergula vernalis*, *Hottonia palustris*, cincidegete sau găinușele (*Potentilla alba*), fragii sau pomnițele (*Fragaria vesca*), căpșunii (*Fragaria viridis*), meiul-pășăresc (*Lithospermum arvense*), *Platanthera chorantha* sau *Platanthera montana*, buruiana-de-junghiuri (*Cephalanthera longifolia*), căpșunica (*Cephalanthera alba* sau *Cephalanthera pallens* sau *Cephalanthera damsonianum* sau și *Cephalanthera grandiflora*), trei-frați sau micșunelele-gălbioare (*Viola rupestris*), orbalțul sau iarba-tâlharului (*Actaea spicata*), *Meum athamanticum* – eventual în Munții Bucegi, după datele vechi, chimenul sau săcăreua (*Carum carvi*), hașmaciuca sau bucinișul (*Anthriscus sylvestris*), asmățuiul-sălbatic (*Chaerophyllum cicutaria* sau *Chaerophyllum hirsutum*), odoleanul (*Valeriana dioica*), talpa-mâței, siminocul sau scânteiuțele-de-munte (*Antennaria dioica*)...

Dintre plantele cu **flori galbene** care încep să înflorească în această lună enumerăm aici: macul-cornut-galben (*Glaucium flavium*), muștarul-de-câmp (*Sinapis arvensis*), boghița sau hreanul-sălbatic (*Rorippa silvestris*), brâncuța sau măcrișul-de-baltă (*Rorippa palustris* sau *Rorippa islandica*), *Rapistrum rugosum*, ruja sau iarba-tunului (*Sedum rosea* sau *Rhodiola rosea*), sclipeții sau iarba-faptului (*Potentilla erecta*), sânzâienele sau drăgaica (*Galium verum*), luminița (*Oenothera biennis*), steregoaia (*Veratrum album*) - bis, nufărul-galben (*Nuphar lutem*), *Ranunculus flammula* și *Ranunculus reptans*, *Ranunculus lingua*, boglarii sau piciorul-cocoșului (*Ranunculus sceleratus*), *Hypericum humisufusm*, *Hypericum montanum*, iarba-osului (*Helianthemum nummularium*), *Fumana procumbens*, gălbinelele sau floarea-de-lungoare sau și bășacănul (*Lysimachia vulgaris*), rumeneala (*Potentilla anglica* sau *Potentilla procumbens*), cincidegete sau iarba-degetelor (*Potentilla reptans*), buruiana-de-cincidegete sau buruiana-apucatului (*Potentilla recta*), scrintitoarea sau iarba-vătămăturii (*Potentilla argentea*), sclipeții (*Potentilla aurea*), iarba-de-șoaldină sau iarba-grasă (*Sedum acre*), *Sedum reflexum* sau *Sedum rupestre*, *Sedum annuum*, *Saxifraga mutata*, *Saxifraga aizoides*, *Oxalis fontana* sau *Oxalis europaea* sau și *Oxalis stricta*, *Blackstonia perfoliata*, lumânărica-peștilor sau floarea-fetelor (*Verbascum nigrum*), moșișoarele (*Liparis loeselii*), omagul (*Aconitum vulparia*), *Impatiens parviflora* – specie cultivată, sor-cu-frate sau miazănoapte (*Melampyrum nemorosum*), rechia sau prescurea (*Reseda lutea*), sulfina sau molotru-galben (*Melilotus officinalis*), lintea-pratului (*Lathyrus pratensis*), drobița sau grozama (*Genista tinctoria*), grozama-mare, sau lemnu-bobului sau și bobîțel (*Lembotropis nigricans* sau *Cytisus nigricans*), culbeceasa sau lucerna-galbenă (*Medicago falcata*), unghia-găii sau iarba-limbricilor (*Astragalus glycyphyllos*), cosacii (*Astragalus cicer*), luntricia (*Oxytropis pilosa*), daria (*Pedicularis sceptrum-carolinum*), degetarul sau iarba-degetului (*Digitalis grandiflora* sau *Digitalis ambigua*), linarița, bumbăcarița sau galbenarea (*Linaria vulgaris*), otrățelul-de-apă sau otrățelul-bălților (*Utricularia vulgaris*), jaleșul-de-câmp sau cinstetel (*Stachys recta*), iarba-negeilor (*Teucrium montanum*), cânepița sau fața-mâței (*Galeopsis speciosa* sau *Galeopsis grandiflora*), rutișorul (*Thalictrum lucidum*), trifoiășul sau

buruiana-de-mătrice (*Trifolium campestre*), trifoiul (*Trifolium spadiceum*), trifoiul-alb (*Trifolium ochroleucon*) – folosit pentru scurgeri albe, păstârnacul (*Pastinaca sativa*), *Silaum silaus*, urechea-iepurelui sau urechea-tătărească (*Bupleurum falcatum*), floarea-de-perină sau șoldea (*Anthemis tinctoria*), floarea-galbenă (*Inula hirta*), cioroiul sau avrămeasca (*Inula salicina*), arnica sau cujda (*Arnica montana*), cruciulița sau spălăcioasa (*Senecio aquaticus* și *Senecio viscosus*), potcapul-călugărului (*Leontodon hispidus*), susaiul-aspru (*Sonchus asper*), susaiul-moale (*Sonchus oleraceus*), zgrăbunțica sau salata-câinelui (*Lapsana communis*), *Crepis paludosa*, crestata (*Aposeris foetida*), rușulița (*Hieracium auranticum*), vulturica (*Hieracium lachenalii* sau *Hieracium vulgatum* sau și *Hieracium argillaceum*)... Dintre plantele cu flori galbene pe care le regăsim înflorite în iunie prezentăm aici pe: rostopasca (*Chelidonium majus*), voinicica (*Descurainia sophia* sau *Sisymbrium sophia*), rapița sau napii-curecești (*Brassica napus*), rapița sau broazba (*Brassica rapa* sau *Brassica campestris*), muștarul-negru sau hroștile (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), brăbinul sau colțul-lupului (*Bunias orientalis*), puturoasa (*Diplotaxis tenuifolia*), *Erucastrum gallicum*, ridichea-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), *Erysimum cheiranthoides*, crușăteaua sau crucea-voinicului (*Barbarea vulgaris*), *Conringia orientalis*, brâncuța sau micsandrele-sălbatică (*Sisymbrium officinale*), ciucușoara (*Alyssum alyssoides* sau *Alyssum calycinum*), drobul (*Neslia paniculata*), ochelarița (*Biscutella laevigata*), *Draba aizoides*, *Tofieldia calyculata*, *Ranunculus bulbosus*, floarea-de-leac (*Ranunculus repens*), corniceii (*Ranunculus arvensis*), piciorul-cocoșului (*Ranunculus acris*), *Ranunculus lanuginosus*, gălbenelele-de-pădure (*Ranunculus nemorosus*), gălbenelele sau rărunchii (*Ranunculus polyanthemos*), *Ranunculus montanus*, bulbucii-de-munte (*Trollius europaeus*), urechea-ursului (*Primula auricula*), *Lysimachia nemorum*, drețele sau floarea-de-lungoare sau și banul-popii (*Lysimachia nummularia*), cerențelul (*Geum urbanum*), coada-racului (*Potentilla anserina*), *Onosma taurica*, pidosnicul (*Cerintho minor*), blabornucul (*Cypripedium calceolus*), viorelele-de-ogoare (*Viola arvensis*), trei-frați-pătați (*Viola tricolor*), viorelele-galbene (*Viola biflora*), vătămătoarea (*Anthyllis vulneraria*), ghizdeiul, sămățișea sau moartea-găinilor (*Lotus corniculatus*), lintea-galbenă sau lintea-sălbatică (*Lathyrus aphaca*), *Genista germanica*, *Hippocrepis comosa*, coroniștea (*Coronilla coronata* sau *Coronilla montana*), *Melampyrum pratense*, *Rhinanthus alectorolophus*, *Rhinanthus minor*, tămâița-de-câmp (*Ajuga chamaepitys*), gălbinița sau urzica-moartă-galbenă (*Galeobdolon luteum* sau *Lamium galeobdolon*), rutișorul sau somnoroasa (*Thalictrum minus*), aliorul sau laptele-cucului (*Euphorbia helioscopia* și *Euphorbia paralias*), trifoiul-mărunt (*Medicago lupulina*), trifoiul (*Trifolium dubium*), *Chamomilla suaveolens* sau *Matricaria discoidea* sau și *Matricaria matricarioides*, spălăcioasa sau cruciulița (*Senecio vernalis*), cruciulița sau iarba-strictoare (*Senecio vulgaris*), barba-caprei (*Tragopogon pratensis* și *Tragopogon dubius*), păpădia (*Taraxacum officinale*), buruiana-porcească (*Hypochoeris radicata*), gălbenușul (*Crepis tectorum*), vulturica (*Hieracium cymosum*, *Hieracium pilosella* și *Hieracium sylvaticum* sau *Hieracium murorum*)... Există plante cu flori galbene pentru care iunie reprezintă ultima lor lună de înflorire, precum: drobușorul sau cardamonul (*Isatis tinctoria*), grozama (*Genista sagittalis* sau *Chamaespartium sagittale*), bărbușoara-de-munte sau turiceaua (*Arabis turrata*), lubițul sau gălbenușul-inului (*Camelina sativa*), smântânică sau iarba-crucii (*Cruciata laevipes* sau *Galium cruciata* sau și *Cruciata chersonensis*), *Tulipa australis*, stânjienii-pestriți sau stânjienii-de-pădure (*Iris variegata*), stânjienii-galbени (*Iris pseudacorus*), calcea-calului (*Caltha palustris*), buruiana-de-nouă-daturi (*Ranunculus auricomus*), ciuboțica-cucului (*Primula veris* sau *Primula officinalis*), *Potentilla tabernaemontani* sau *Potentilla neumanniana* sau și *Potentilla verna*, *Herminium monorchis*, mărul-lupului sau cucurbetica (*Aristolochia clematis*), ghizdeiul-mare (*Tetragonolobus maritimus* sau *Lotus siliquosus* sau și *Lotus maritimus*), *Chamaecytisus ratisbonensis* sau *Cytisus ratisbonensis*, *Lysimachia thyrsoflora*, aliorul sau laptele-câinelui (*Euphorbia dulcis*, *Euphorbia seguieriana* sau *Euphorbia gerardiana* și *Euphorbia cyparissias*), lucerna (*Medicago minima*), *Scorzonera humilis*, barba-lupului (*Crepis biennis*)...

Dintre plantele cu **flori roșii, roze** sau **purpurii** care încep să înflorească în luna iunie enumerăm: pufulița (*Epilobium hirsutum* și *Epilobium montanum*), ruja (*Rhodiola rosea* sau *Sedum rosea*), răchițelele (*Oxycoccus palustris* sau *Vaccinium oxycoccus*), crinul-de-pădure (*Lilium martagon*), *Allium vienale*, crinul-roșu (*Lilium bulbiferum*), roșăteaua sau crinul-de-baltă (*Butomus umbellatus*), ruscuța-primăvărată (*Adonis aestivalis*), neghina (*Agrostemma githago*), vâul-miresei (*Gypsophila muralis*), săpunarița sau odogaciul (*Saponaria officinalis*) - bis, *Petrorhagia saxifraga* sau *Tunica saxifraga* sau și *Kohlrauschia saxifraga*, *Silene gallica*, iarba-roșioară (*Silene acaulis*), garoafele (*Dianthus carthusianorum*, *Dianthus superbus* și *Dianthus armeria*), garofițele (*Dianthus deltoides*), *Malva moschata*, cașul-popii (*Malva neglecta*), nalba (*Malva sylvestris*), *Malva alcea*, scânteiuța (*Anagallis arvensis*), ochiul-găinii (*Primula minima*), șapte-degete (*Potentilla palustre* sau *Comarum palustre*), verdeța-iernii (*Chimaphila umbellata* sau *Pyrola umbellata*), *Saxifraga mutata*, *Saxifraga aizoides*, frigările (*Geranium palustre*), *Geranium sanguineum*, volbura (*Convolvulus arvensis*), gladiolele (*Gladiolus palustris*), *Anacamptis pyramidalis*, *Traunsteinera globosa* sau *Orchis globosa*, sângele-voinicului (*Nigritella nigra*), *Dactylorhiza fuchsii* sau *Dactylorhiza maculata*, trifoiul (*Trifolium ornithopodioides* sau *Trigonella ornithopodioides*), orăștica (*Lathyrus niger*), oreșnița (*Lathyrus tuberosus*), coroniștea (*Coronilla varia* sau *Securigera varia*), osu-iepurelui (*Ononis spinosa*), răchitanul sau cârligăteaua (*Lythrum salicaria*), daria (*Pedicularis rostrato-capitata*) – menționată de autorii vechi, degețelul-roșu (*Digitalis purpurea*), *Galeopsis bifida*, fața-mâței (*Galeopsis angustifolia*), lungurica (*Galeopsis tetrahit*), talpa-gâștii (*Leonorus cardiaca*), crețișorul (*Betonica officinalis* sau *Stachys officinalis*), busuiocul (*Ocimum basilicum*), bălbisa (*Stachys palustris*), cătușnica (*Nepeta cataria*), cimbrul sau cimbrîșorul (*Thymus pulegioides*), *Allium carinatum*, *Allium vienale*, ceapa-de-tuns (*Allium scoenoprasum*), *Allium rotundum*, sălcuța sau troscotul-de-baltă (*Polygonum amphibium*), bria sau brioala (*Ligusticum mutellina*), trifoiul-roșu (*Trifolium pratense*), *Trifolium alpestre*, papanășii (*Trifolium arvense*), *Trifolium rubens*, odoleanul (*Valeriana officinalis*), torțelul (*Cuscuta europaea*), ciucurașii (*Adenostyles alliariae*), coada-șoricelului sau strănutătoarea (*Achillea millefolium*), *Centaurea jacea*, *Centaurea scabiosa*, rușulița (*Hieracium aurantiacum*), crăpușnicul sau scaiul (*Cirsium vulgare*), *Carduus acanthoides* sau *Carduus camporum*, *Carduus crispus*, scaiul-măgăresc (*Onopordum acanthium*), armurariul (*Silybum marianum*)... Dintre plantele cu flori roșii, roze sau purpurii care continuă să fie înflorite în decursul lunii iunie prezentăm: macul-roșu-de-câmp (*Papaver rhoeas*), macul-de-câmp (*Papaver dubium*), frigurele (*Cardaminopsis arenosa*), *Spergularia rubra*, *Spergularia salina* sau *Spergularia marina*, floarea-cucului (*Lychnis flos-cuculi*), lipicioasa (*Lychnis viscaria* sau *Lychnis vulgaris*), șerparița (*Glaux maritima*), ochii-broaștei (*Primula farinosa*), *Saxifraga oppositifolia*, ciocul-berzei (*Geranium lucidum*, *Geranium molle* și *Geranium dissectum*), năpraznica (*Geranium robertianum*), pliscul-cocorului (*Erodium cicutarium*), priboiul (*Geranium rotundifolium*), pliscarița (*Geranium pyrenaicum*), limba-boului-sălbatică (*Anchusa officinalis*), tătâneasa (*Symphytum officinale*), căpușnica (*Cephalanthera rubra*), *Dactylorhiza incarnata* sau *Orchis incarnata*, fumarița (*Fumaria officinalis*), mazăricea-de-primăvară (*Vicia sativa*), sparceta (*Onobrychis viciifolia*), miazănoaptea (*Melampyrum arvense*), pintenelul (*Pedicularis palustris*), rușinea-țigăncii (*Lamium purpureum*), urzica-moartă (*Lamium maculatum*), rutișorul (*Thalictrum aquilegifolium*), răculețul (*Polygonum bistorta*), *Armeria maritima*, *Trifolium hybridum*, odoleanul (*Valeriana montana*), pătlagina (*Plantago media*), bănuțeii (*Bellis perennis*) - bis, *Cirsium rivulare* sau *Cirsium salisburgense*, *Cirsium tuberosum* sau *Cirsium bulbosum*... Dintre plantele cu flori roșii, roze sau purpurii pentru care iunie reprezintă ultima lună a înfloririi lor, sunt: macul (*Papaver argemone*), tășculița (*Aethionema saxatile*), opaița-roșie (*Silene dioica*), bujorul (*Paeonia officinalis*), *Hottonia palustris*, călțunul-Doamnei (*Geum rivale*), mierea-ursului sau cuscrișorul (*Pulmonaria mollis* și *Pulmonaria montana*), *Ophrys insectifera* sau *Ophrys muscifera*, *Ophrys holoserica* sau *Ophrys fuciflora* sau și *Ophrys arachuites*, albina (*Ophrys apifera*), *Gymnadenia conopsea*,

Dactylorhiza majalis sau *Orchis latifolia* sau și *Orchis majalis*, poroinicul (*Orchis mascula*, *Orchis militaris*, *Orchis purpurea*), *Orchis ustulata*, untul-vacii (*Orchis morio*), pribolnicul (*Orchis simia*), frâsinelul (*Dictamnus albus*), *Lathyrus linifolius* sau *Lathyrus montanus*, seradela (*Ornithopus perpusillus*), asmățuiul-sălbatic (*Chaerophyllum hirsutum* sau *Chaerophyllum cicutaria*), *Bupleurum longifolium*, odolean (*Valeriana dioica*), cujucăreaude-munte (*Valeriana tripteris*), paraipanul sau siminicul (*Antennaria dioica*), crăpușnicul (*Cirsium palustre*)...

Plantele cu **flori de culoare albastră, lila sau violet** care își încep înflorirea în iunie: *Sherdaria arvensis*, *Gentiana ciliata*, ventrilică, strătorică (*Veronica officinalis*), *Veronica fruticans*, *Veronica aphylla*, *Veronica teucrium*, băieței (*Veronica spicata* sau *Pseudolysimachia spicata*), scânteiuța (*Anaglais arvensis*) - bis, ineța (*Linum perenne*), *Linum usitatissimum* – specie cultivată, greghetinul (*Geranium pratense*), *Gentiana acaulis* sau *Gentiana kochiana* sau și *Gentiana excisa*, *Gentiana nivalis*, *Swertia perennis*, scara-Domnului (*Polemonium caeruleum*), limba-mielului (*Borago officinalis*), lipiciul (*Lappula squarrosa* sau *Lappula echinata*), zârna (*Solanum dulcamara*), iarba-șarpelui sau sudoarea-calului (*Echium vulgare*), nu-m-uita (*Myosotis alpestris*), clopoței (*Campanula rapunculoides*, *Campanula rapunculus*, *Campanula rotundifolia*, *Campanula persicifolia*), ciucurele (*Campanula glomerata*), floarea-Sfintei-Vineri (*Legousia speculum-veneris*), omagul (*Aconitum napellus* sau *Aconitum romanicum* și *Aconitum variegatum paniculatum*), costița (*Vicia hirsuta*), mazărichea (*Vicia tetrasperma*, *Vicia cracca*, *Vicia cassubica*, *Vicia dumetorum*), mazărichea-de-pădure (*Vicia sylvatica*), mazărichea-păroasă (*Vicia villosa*), lucerna (*Medicago sativa*), luntricia (*Oxytropis halleri*), pupezele (*Lathyrus niger*), iarba-șarpelui sau sudoarea-calului (*Echium vulgare*) - bis, *Chaenarrhinum minus* sau *Microrrhinum minus*, *Cymbalaria muralis* sau *Linaria cymbalaria*, linarița-de-munte (*Linaria alpina*), bursuca (*Bartsia alpina*), *Prunella grandiflora*, busuiocul-de-câmp (*Prunella vulgaris*), urechea-porcului (*Salvia verticillata*), jaleșul-de-grădină (*Salvia officinalis*) – specie cultivată, cimbrul-mare-de-munte (*Calamintha alpina*), *Scutellaria galericulata*, izmușoara-de-câmp (*Acinos arvensis* sau *Calamintha arvensis*), *Knautia dipsacifolia* sau *Knautia sylvatica*, *Jasione montana*, albăstrica (*Aster tripolium*), bunghișorul (*Erigeron annuus* și *Erigeron acris*), albăstrița sau vinețelele (*Centaurea cyanus*), *Centaurea jacea*, *Centaurea scabiosa*... Dintre plantele cu flori albastre, lila sau violet care continuă să rămână în floare sunt: lopățeaua (*Lunaria rediviva*), nopticoasa (*Hesperis matronalis*), curpenul-de-munte (*Clematis alpina*), șopârlița (*Veronica arvensis*, *Veronica serpyllifolia*, *Veronica anagallis-aquatica*), ventrilică (*Veronica persica*), bobornicul (*Veronica beccabunga*), căldărușa (*Aquilegia vulgaris*) – specie cultivată, *Soldanella pusilla*, ghințura (*Gentiana clusii*, *Gentiana utriculosa*), ochincelele (*Gentiana verna*), limba-boului sau miruța (*Anchusa officinalis*), ochiul-lupului (*Anchusa arvensis* sau *Lycopsis arvensis*), limba-câinelui (*Cynoglossum officinale*), tătăneasa (*Symphytum officinale*), nu-mă-uita (*Myosotis palustris* sau *Myosotis scorpioides*, *Myosotis sylvatica*, *Myosotis arvensis*), clopoței (*Campanula patula*), garbița (*Limodorum abortivum*), nemțișorul-de-câmp (*Consolida regalis* sau *Delphinium consolida*), trei-frați-pătați (*Viola tricolor*), mazărichea-de-primăvară (*Vicia sativa*), mazăroiul-sălbatic (*Vicia sepium*), amăreala (*Polygala vulgaris*), foaia-grasă (*Pinguicula vulgaris*), coada-mielului (*Verbascum phoeniceum*), salvia-de-câmp (*Salvia pratensis*), vinețica (*Ajuga reptans*), bănica sau schinuța (*Phyteuma orbiculare*), rotunjoare (*Homogyne alpina*),... Există plante cu petalele de culoare albastră, lila sau violet, pentru care iunie reprezintă ultima lună în care mai rămân în floare, precum: colțișorul (*Dentaria bulbifera*), stupitul-cucului (*Cardamine pratensis*), *Asperula arvensis*, șopârlița (*Veronica chamaedrys*), sburătorul (*Veronica austriaca*), stânjenei (*Iris sibirica*), mierea-ursului sau cuscrișorul (*Pulmonaria mollis* sau *Pulmonaria montana*), mărgeleușele (*Lithospermum purpureocaeruleum*), *Viola riviviana*, *Viola mirabilis*, *Viola palustris*, *Viola rupestris*, mănereii-de-pădure (*Lathyrus linifolius* sau *Lathyrus montanus*), amăreala (*Polygala amara* și

Polygala comosa), sulimanul (*Ajuga genevensis*), rotunjoara sau silnicul (*Glechoma hederacea*), *Scorzonera purpurea*, lăptuca (*Lactuca perennis*)...

Dintre plantele cu **flori verzi, brune** sau **nesemnificative**, care încep înflorirea în luna iunie numim: broscărița sau iarba-șerpilor (*Triglochin palustre*), *Triglochin maritimum*, broscărița (*Potamogeton pusillus*, *Potamogeton pectinatus*, *Potamogeton perfoliatus*, *Potamogeton natans*, *Potamogeton alpinus*), așa-de-mare (*Ruppia maritima*), iarba-de-mare (*Zostera marina*), inarița-mare (*Najas marina*), buzduganul (*Sparganium emersum* sau *Sparganium simplex*), mlăștinița (*Epipactis helleborine* sau *Epipactis latifolia*, *Epipactis purpurata* sau *Epipactis sessilifolia* sau și *Epipactis violacea*, *Epipactis palustris*), buzișorul (*Corallorhiza trifida*), parachernița (*Parietaria officinalis* sau *Parietaria erecta*), urzica (*Urtica dioica*), feciorica (*Herniaria glabra*), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), măcrișelul (*Oxyria digyna*), troscotul (*Polygonum aviculare*), măcrișul-calului (*Rumex obtusifolius* și *Rumex conglomeratus*), dragaveiul (*Rumex crispus*), aliorul, laptele-câinelui sau laptele-cucului (*Euphorbia exigua*), *Euphorbia humifusa* sau *Chamaesyce humifusa*, sugătoarea (*Monotropa hypopitys*), coada-mânzului (*Hippuris vulgaris*), lupoaia sau verigelul (*Orobancha teucarii*), chenarul-bălților (*Littorella uniflora*), pătlagina-mare (*Plantago major*)... Printre florile verzi, brune sau nemnificative care continuă să rămână în floare în iunie, amintim: ciuma-apelor (*Elodea canadensis*), *Groenlandia densa* sau *Potamogeton densus*, broscărița (*Potamogeton crispus*), mătrița (*Zannichellia palustris*), obligeana (*Acorus calamus*), papucul-doamnei (*Cyperipedium calceolus*), *Listera cordata*, grășătoarea (*Sagina ciliata* sau *Sagina apetala* și *Sagina procumbens*), *Scelerathus annuus*, măcrișul-comun (*Rumex acetosa*), măcrișul-mărunt (*Rumex acetosella*), păduchernița (*Lepidium ruderales*), trepădătoarea (*Mercurialis annua*), aliorul, laptele-câinelui sau laptele-cucului (*Euphorbia helioscopia*, *Euphorbia peplus*, *Euphorbia paralias*), crețișoarele (*Aphanes arvensis*), crețișoara (*Alchemilla vulgaris*), cebăreua (*Sanguisorba minor*), ochiul-lupului (*Nonea pulla*), limba-câinelui (*Cynoglossum officinale*), păpălăul (*Physalis alkekengi*), lupoaia sau verigelul (*Orobancha gracilis*), drențele (*Callitriche palustris*), pătlagina-cu-frunze-înguste (*Plantago lanceolata*), pătlagina (*Plantago media* și *Plantago cornopus*)... Plantele colorate în verde, brun ori nesemnificativ, pentru care iunie reprezintă ultima lună de înflorire, sunt: *Scheuchzeria palustris*, lintița (*Lemna trisulca*), *Spirodela polyrhiza*, dalacul (*Paris quadrifolia*), rodu-pământului (*Arum maculatum*), fluierătoarea, vița-neagră sau untu-pământului (*Tamus communis*), *Coeloglossum viride*, buhaiul (*Listera ovata*), *Ophrys insectifera* sau *Ophrys muscifera*, *Ophrys holosericea* sau *Ophrys arachnites* sau și *Ophrys fuciflora*, cuibușorul (*Neottia nidus-avis*), *Himantoglossum hircinum*, codițuca (*Myosurus minimus*), *Lepidium perfoliatum*, hrenița (*Lepidium campestre*), aliorul. Laptele-câinelui sau laptele-cucului (*Euphorbia dulcis*), fetica (*Valerianella locusta*)...

Graminele care încep să înflorească: bucățelul (*Agrostis canina*), păiușul sau firuța (*Agrostis tenuis*), *Sieglingia decumbens* sau *Danthonia decumbens*, obsiga sau iarba-vântului (*Bromus sterilis*), obsiga sau ovezica (*Bromus tectorum*), târsaca (*Bromus inermis*), iarbanisipului (*Corynephorus canescens*), obsiga sau grâul-sălbatic, (*Brachypodium pinnatum*), obsiga (*Brachypodium sylvaticum*), păiușul (*Deschampsia cespitosa* și *Deschampsia flexuosa*), trestia-de-câmp (*Calamagrostis epigejos*), stuhul-sălbatic (*Calamagrostis varia* sau *Calamagrostis montana*), păiușul-roșu (*Festuca rubra*), păiușul-de-livadă (*Festuca pratensis*), flocoșica (*Holcus lanatus*), iarba-deasă (*Poa nemoralis*), ovăsciorul (*Arrhenatherum elatius*), orzul-pădureț (*Hordelymus europaeus* sau *Elymus europaeus*), *Phalaris arundinacea* sau *Typhoides arundinacea*, iarba-albastră (*Molinia caerulea*), iarba-vântului (*Apera spica venti*), *Koeleria pyramidata*, mohorul-verde (*Setaria viridis*), *Lolium multiflorum* sau *Lolium italicum*, *Agropyron repens*, timoftica (*Phleum pratense* și *Phleum phleoides*), *Ammophila arenaria* – probabil pe litoralul Mării Negre, *Agropyron junceum* sau *Elymus farctus*, bumbăcarița (*Eriophorum scheuchzeri*), *Rhynchospora alba*, pipiriguțul (*Eleocharis acicularis*), rogozul sau șovarul (*Bolboschoenus maritimus* sau *Scirpus maritimus*), țipirigul (*Scirpoides holoschoenus* sau *Holoschoenus romanus* sau și *Holoschoenus vulgaris*),

Cladium mariscus, *Blysmus compressus*, pipirigul (*Schoenoplectus lacustris* sau *Scirpus lacustris*), *Schoenoplectus tabernaemontani*, rogozul (*Carex remota*, *Carex ovalis* sau *Carex leporina*, *Carex pseudocyperus*, *Carex flava*, *Carex sempervirens*), pipirigul-american (*Juncus tenuis*), speteaza (*Juncus effusus*), pipirigul (*Juncus conglomeratus*, *Juncus gerardii*, *Juncus inflexus* sau *Juncus glaucus*, *Juncus filiformis*), iarba-broaștei sau iarba-bivolului (*Juncus bufonius*), broscărița sau iarba-șerpilor (*Triglochin palustre*), *Triglochin maritima*... Gramineele care continuă să rămână în floare: țapoșica (*Nardus stricta*), obsiga (*Bromus erectus*), păiușul (*Festuca ovina*), golomățul (*Dactylis glomerata*), firuța (*Poa annua*), firușca-șopârlilor (*Poa alpina*), merișorul (*Milium effusum*), colilia (*Stipa pennata*), orzul-șoarecilor (*Hordeum murinum*), *Hordeum marinum*, coada-vulpiei (*Alopecurus pratensis*), pipiriguțul (*Eleocharis palustris*), bumburezul (*Schoenus nigricans*), pipirigul (*Scirpus sylvaticus*), rogozul (*Carex echinata* sau *Carex stellulata*, *Carex flacca*, *Carex hostiana*, *Carex sylvatica*), obligeana (*Acorus calamus*)... Printre gramineele pentru care iunie reprezintă ultima lună cu floare numim: tremurătoarea (*Briza media*), mărșica (*Melica uniflora*, *Melica nutans*, *Melica ciliata*), firuța (*Poa pratensis*), șuvarul-de-munte (*Poa trivialis*), pieptănarița (*Cynosurus cristatus*), ovăsciorul-auriu (*Trisetum flavescens*), vițelarul (*Anthoxanthum odoratum*), bumbăcărița (*Eriophorum latifolium*), *Schoenus ferrugineus*, rogozul (*Carex davalliana*, *Carex pauciflora*, *Carex chordorrhiza*, *Carex paniculata*, *Carex cansecens* sau *Carex curta*, *Carex brizoides*, *Carex gracilis* sau *Carex acuta*, *Carex nigra* sau *Carex goodenowii*, *Carex hirta*, *Carex rostrata*, *Carex vesicaria*, *Carex pendula*, *Carex pallescens*, *Carex panicea*, *Carex alba*), hroștile (*Luzula sylvatica*), *Scheuchzeria palustris*...

Dintre **arborii** și **arbuștii** care încep să înflorească acuma enumerăm: jneapănul (*Pinus mugo* sau *Pinus montana*), zâmbrul (*Pinus cembra*), castanul-bun (*Castanea sativa*), teiul-cu-frunză-mică sau teiul-pucios (*Tilia cordata*), teiul-cu-frunză-mare (*Tilia platyphyllos*), curpenul (*Clematis vitalba*), cătina-mică (*Myricaria germanica*), măceșul (*Rosa arvensis*, *Rosa canina*), măceșul-de-munte (*Rosa pendulina*), bășicoasa (*Colutea arborescens*), lemnul-câinesc (*Ligustrum vulgare*), *Loiseleuria procumbens*, *Potentilla fruticosa* – cultivată, provine din America-de-Nord, iarba-neagră sau mărtăloaga (*Calluna vulgaris*), *Salix retusa*, merișorul (*Vaccinium vitis-idaea*)... Arborii și arbuștii care continuă să rămână în floare în luna iunie: arinul-de-munte (*Alnus viridis*), cătina-roșie (*Tamarix gallica*) – specie cultivată, salcia (*Salix alba*), tămâița (*Daphne cneorum*), *Ledum palustre* – care se poate să fi dispărut din flora țării noastre, strugurii-ursului (*Arctostaphylos uva-ursii*)... Printre arborii și arbuștii pentru care iunie este ultima lună cu floare amintim: bradul (*Abies alba*), molidul (*Picea abies*), pinul-neted (*Pinus strobus*), scorușul-de-munte (*Sorbus aucuparia*), sorbul (*Sorbus aria* și *Sorbus torminalis*), paltinul sau paltinul-de-munte (*Acer pseudoplatanus*), jugastrul (*Acer campestre*), salcâmul sau acățul (*Robinia pseudoacacia*), ienupărul (*Juniperus communis*), carpenul (*Carpinus betulus*), dracila (*Berberis vulgaris*), *Salix pentandra*, păducelul (*Crataegus monogyna*, *Crataegus oxyacantha* sau *Crataegus laevigata*), zmeurul (*Rubus idaeus*), murul (*Rubus caesius*), drobul sau măturile (*Sarothamnus scoparius* sau *Cytisus scoparius*), frâsinelul (*Dictamnus albus*), laurul (*Ilex aquifolium*), salba-moale (*Euonymus europaeus*), spinul-cerbului (*Rhamnus catharticus*), crușânul (*Frangula alnus* sau *Rhamnus frangula*), sângerelul (*Cornus sanguinea*), socul-negru (*Sambucus nigra*), bozul (*Sambucus ebulus*), dârmoxul (*Viburnum lantana*), călinul (*Viburnum opulus*), caprifoiul (*Lonicera xylosteum*, *Lonicera nigra* și *Lonicera caprifolium*), clocotișul (*Staphylea pinnata*), mesteacănul-pitic (*Betula nana*), *Salix hastata*, afinul (*Vaccinium myrtillus*), afinul-vânăț (*Vaccicum uliginosum*), arborele-pagodelor (*Ginkgo biloba*)...

În luna iunie se pot consuma următoarele părți de plante:

Frunzele tinere, respectiv **acele** proaspete de larice (*Larix decidua*), dracilă (*Berberis vulgaris*), urzică-mare (*Urtica dioica*), mesteacăn-pufos (*Betula pubescens carpatica* sau și *Betula alba glutinosa*), lobodă (*Atriplex patula*), lobodă sau spanacul-sălbatic (*Chenopodium*

album), spanacul-ciobanilor (*Chenopodium bonus-henricus*), știrul-aspru sau știrul-porcesc (*Amaranthus retroflexus*), măcrișel (*Oxyria digyna*), răculeț (*Polygonum bistorta*), hrișcă-urcătoare (*Polygonum convolvulus*), piperul-bălții (*Polygonum hydropiper*), măcrișul (*Rumex acetosa*), stegia (*Rumex alpinus*), tei-hibrid (*Tilia × vulgaris*), nalbă (*Malva sylvestris*), micșunele sau toporași (*Viola odorata*), usturoiță (*Alliaria petiolata*), hrean (*Armoracia rusticana*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), *Cakile maritima euxina* - în Dobrogea, traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), stupitul-cucului (*Cardamine pratensis*), urda-vacii (*Cardaria draba* sau *Lepidium draba*), puturoasă (*Diplotaxis eruroides*) – doar la Sulina, hrenoasă (*Lepidium latifolium*), ridiche-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), boghiță sau hrean-sălbatic (*Rorippa sylvestris*), muștar-de-câmp (*Sinapis arvensis* sau *Brassica arvensis*), brâncuță (*Sisymbrium officinale*), iarbă-roșie sau buruiana-viermelui (*Thlaspi arvense*), rechia sau poala-Sfintei-Mării (*Reseda lutea*), strugurii-ursului (*Arctostaphylos uvaursi*), *Sedum reflexum* sau *Sedum rupestre*, crețișoară (*Alchemilla vulgaris*), fragi (*Fragaria vesca*), cerențel, crânceș sau rădichioară (*Geum urbanum*), cebărea (*Sanguisorba minor*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), trifoi-roșu (*Trifolium pratense*), pufuliță sau bisacăn (*Epilobium angustifolium*), măcrișul-iepurelui (*Oxalis acetosella*), piciorul-caprei (*Aegopodium podagraria*), angelină-sălbatică (*Angelica sylvestris*), chimen (*Carum carvi*), morcov-sălbatic (*Daucus carota*), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (*Foeniculum vulgare*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), păstârnac (*Pastinaca sativa*), *Peucedanum ostruthium*, limba-mielului sau otrătel (*Borago officinalis*), plumănărică sau mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), tătăneasă (*Symphytum officinale*), rotunjoară sau silnic (*Glechoma hederacea*), urzică-moartă (*Lamium album*), levănțică (*Lavandula angustifolia*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), mentă-sălbatică (*Mentha arvensis*), cătușnică sau iarbă-flocoasă sau și iarba-măței (*Nepeta cataria*), bălbisă sau iarba-păduchilor sau și jale (*Stachys sylvatica*), cimbrisor (*Thymus serpyllum*), pătlagină-mare (*Plantago major*), clopoței (*Campanula rapunculus*), cărbuni sau pușca-dracului (*Phyteuma spicatum*), odolean, iarba-pisicii (*Valeriana officinalis*), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (*Aposeris foetida*), gălbenuși (*Crepis capillaris*), lăptucă (*Lactuca serriola*), zgrăbunțică sau salata-câinelui sau și iarba-zgaibeii (*Lapsana communis*), susai-de-pădure (*Mycelis muralis* sau *Lactuca muralis*), salată-de-iarnă sau salsifis (*Scorzonera hispanica*), susai (*Sonchus oleraceus*), păpădie (*Taraxacum officinale*), țâța-caprei (*Tragopogon pratensis*), bănuței sau părăluțe (*Bellis perennis*), scai-gălbincios sau nilocea sau și crăstăval (*Cirsium oleraceum*), captalan sau brusture (*Petasites hybridus*) – pețiolul frunzelor, lemnul-Maicii-Domnului (*Santolina chamaecyparissus*), armurariu (*Silybum marianum*), vetrice sau călăpăr (*Tanacetum vulgare*) – cu prudență, planta fiind puțin toxică –, podbal sau gălbenele (*Tussilago farfara*), *Allium vineale*...

Plantele, respectiv **tijele** tinere, **mugurii** sau **turiones** de brad (*Abies alba*), molid (*Picea abies*), ienupăr (*Juniperus communis*), hamei sau homei (*Humulus lupulus*), paracherniță (*Parietaria officinalis*), cârmâz (*Phytolacca americana*), rocoină (*Stellaria media*), iarbă-grasă sau grașiță (*Portulaca oleracea sylvestris*), iarbă-sărată sau brâncă (*Salicornia europaea*), năsturel (*Nasturtium officinale*), pufuliță sau bisacăn (*Epilobium angustifolium*), angelină-sălbatică (*Angelica sylvestris*), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (*Foeniculum vulgare*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), bălbisă, iarba-păduchilor sau jale (*Stachys sylvatica*), bobornic (*Veronica beccabunga*), clopoței (*Campanula rapunculus*), susai (*Sonchus oleraceus*), păpădie (*Taraxacum officinale*), scaiul-oii (*Arctium lappa*), crăpușnic sau scai-lânos (*Cirsium eriophorum*), scai-gălbincios sau nilocea sau și crăstăval (*Cirsium oleraceum*), buruiana-cătanelor (*Galinsoga parviflora*), captalan sau brusture (*Petasites hybridus*), armurariu (*Silybum marianum*), papură (*Typha latifolia*), fluierătoare sau viță-neagră sau și untul-pământului (*Tamus communis*)...

Rădăcinile (sau după caz, **rizomii**, **tubercuții**, **bulbii**) de ferigă-de-câmp (*Pteridium aquilinum*), răculeț (*Polygonum bistorta*), hrean (*Armoracia rusticana*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), hrenoasă (*Lepidium latifolium*), cerențel sau rădichioară (*Geum urbanum*) – cu precizarea că la Năsăud în această lună nu are nici un gust, coada-racului sau argentină (*Potentilla anserina*), cărbuni (*Phyteuma spicatum*), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (*Apoeseris foetida*), păpădie (*Taraxacum officinale*), țâța-caprei (*Tragopogon pratensis*), iarbă-mare (*Inula helenium*), pir-târâtor (*Elymus repens*), *Allium vineale*...

Polenul de papură (*Typha latifolia*)...

Florile de mac (*Papaver rhoeas*), tei-hibrid (*Tilia × vulgaris*), nalbă (*Malva sylvestris*), usturoiță (*Alliaria petiolata*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), stupitul-cucului (*Cardamine pratensis*), urda-vacii sau hreniță-surie (*Cardaria draba* sau *Lepidium draba*), ridiche-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), boghiță sau hrean-sălbatic (*Rorippa sylvestris*), rechia sau poala-Sfintei-Mării (*Reseda lutea*), griciorei (*Primula vulgaris* sau *Primula acaulis*), măceș (*Rosa canina*), crețușcă (*Filipendula ulmaria*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), salcâm (*Robinia pseudoacacia*), trifoi-roșu (*Trifolium pratense*), pufuliță sau bisacăn (*Epilobium angustifolium*), crucea-pământului (*Heracleum sphondylium*), limba-mielului sau otrățel (*Borago officinalis*), plumânărică sau mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), isop (*Hyssopus officinalis*), urzică-moartă (*Lamium album*), levănțică (*Lavandula angustifolia*), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (*Melissa officinalis*), mentă-sălbatică (*Mentha arvensis*), cătușnică sau iarbă-flocoasă sau și iarba-măței (*Nepeta cataria*), jaleș (*Salvia pratensis*), cimbrisor (*Thymus serpyllum*), clopoței (*Campanula rapunculus*), soc-negru (*Sambucus nigra*), odolean, iarba-pisicii (*Valeriana officinalis*), răsfug (*Chondrilla juncea*), salată-de-iarnă (*Scorzonera hispanica*), păpădie (*Taraxacum officinale*), țâța-caprei (*Tragopogon pratensis*), bănuței sau părăluțe (*Bellis perennis*), filimică (*Calendula arvensis*), mușetel (*Matricaria suaveolens* sau *Matricaria discoidea* sau și *Chamomilla suaveolens*), crăpușnic sau scai-lânos (*Cirsium eriophorum*), scai-gălbincios sau nilocea sau și crăstăval (*Cirsium oleraceum*), margaretă (*Leucanthemum vulgare*), lemnul Maicii-Domnului (*Santolina chamaeciparissus*), armurariu (*Silybum marianum*), podbal sau gălbenele (*Tussilago farfara*), vetrice sau călăpăr (*Tanacetum vulgare*) – cu prudență, planta fiind puțin toxică – papură (*Typha latifolia*) – florile femele, *Allium vineale* – inclusiv bulbilii de la baza florilor...

Fructele (bacele, conurile, semințele) de ienupăr (*Juniperus communis*), mac (*Papaver rhoeas*), nalbă (*Malva sylvestris*), usturoiță (*Alliaria petiolata*), muștar-negru (*Brassica nigra* sau *Sinapis nigra*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), urda-vacii sau hreniță-surie (*Cardaria draba* sau *Lepidium draba*), ridiche-sălbatică (*Raphanus raphanistrum*), muștar-de-câmp (*Sinapis arvensis* sau *Brassica arvensis*), brâncuță (*Sisymbrium officinale*), iarbă-roșie sau buruiana-viermelui (*Thlaspi arvense*), strugurii-ursului (*Arctostaphylos uvaursi*), agriș (*Ribes uva-crispa*), cireș-pășăresc (*Prunus avium*), lucernă (*Medicago sativa*), sulfină (*Melilotus officinalis*), cătină-albă (*Hippophaë rhamnoides*), arțar (*Acer platanoides*), măcrișul-iepurelui (*Oxalis acetosella*), *Peucedanum ostruthium*, *Aegilops geniculata* sau *Aegilops ovata*, odos (*Avena fatua*), rourică (*Glyceria fluitans*), orzul-șoarecilor (*Hordeum murinum*)...

Medicinale:

Se pot recolta, în decursul lunii iunie **rădăcini (radix)**, iar după caz **rizomi (rhizoma) bulbul (bulbus)** sau **tubercuții (tuber)** de cârmâz (*Phytolacca americana*), răculeț (*Polygonum bistorta*), crețușcă (*Filipendula ulmaria*), cerențel (*Geum urbanum*), pufuliță (*Epilobium hirsutum*), amăreală (*Polygala amara*), leuștean (*Levisticum officinale*), pătrunjel

(*Petroselinum hortense*), cătină-mică (*Myricaria germanica*), cătină-roșie (*Tamarix ramosissima*), napi (*Brassica napus*), ridiche (*Raphanus sativus*), mutătoare (*Bryonia alba*), roibă (*Rubia tinctorum*), limba-boului (*Anchusa officinalis*), buberic (*Scrophularia nodosa*), cînsteț (*Salvia glutinosa*), vulturică (*Hieracium pilosella*), ceapă (*Allium cepa*), păpădie (*Taraxacum officinale*), ai-de-munte (*Allium victorialis*), sparanghel (*Asparagus officinalis*), poroinic (*Dactylorhiza maculata*) – specie ocrotită, pir (*Agropyrum repens*), **ramuri tinere, lăstari, muguri** de mesteacăn (*Betula pendula*), **frunze (folium)**, **cetină, ace și ramuri tinere** de jneapăn (*Pinus mugo*), brad (*Abies alba*), curpen-de-pădure (*Clematis vitalba*), măcriș (*Rumex acetosa*), mesteacăn (*Betula pendula*), alun (*Corylus avellana*), dud-alb (*Morus alba*), dud-negru (*Morus nigra*), urzică (*Urtica dioica*), nuc (*Juglans regia*), coacăz-negru (*Ribes nigrum*), păducel (*Crataegus monogyna*), fragi (*Fragaria vesca*), moșmon (*Mespilus germanica*), păr (*Pyrus sativa*), mur (*Rubus caesius*), drobiță (*Genista tinctoria*), scumpie (*Cotinus coggygria*), castan-sălbatec (*Aesculus hippocastanum*) – fără pețiol, măcrișul-iepurelui (*Oxalis acetosella*), ciocul-berzei (*Erodium cicutarium*), salbă-moale (*Euonymus europea*), iederă (*Hedera helix*), leuștean (*Levisticum officinale*), pătrunjel (*Petroselinum hortense*), roua-cerului (*Drosera rotundifolia*), cătină-mică (*Myricaria germanica*), cătină-roșie (*Tamarix ramosissima*), drobușor (*Isatis tinctoria*), brâncuță (*Sisymbrium officinale*), nalbă-mare (*Althaea officinalis*), nalbă-de-cultură (*Malva glabra*), cașul-popii (*Malva neglecta*), afin (*Vaccinium myrtillus*), trifoiște (*Menyanthes trifoliata*), frasin (*Fraxinus excelsior*), lemn-câinesc (*Ligustrum vulgare*), mătrăgună (*Atropa bella-dona*), ciumăfaie (*Datura stramonium*), limba-boului (*Anchusa officinalis*), limba-mielului (*Borago officinalis*), mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), degetar (*Digitalis grandiflora*), degețel-roșu (*Digitalis purpurea*), pătlagină-îngustă (*Plantago lanceolata*), pătlagină (*Plantago media*), vineriță (*Ajuga reptans*), roiniță (*Melissa officinalis*), dumbrașnic (*Melittis melissophyllum*), izma-broaștei (*Mentha aquatica*), izmă-bună (*Mentha × piperita*), jaleș-de-grădină (*Salvia officinalis*), lemnul-domnului (*Artemisia abrotanum*), anghinare (*Cynara scolymus*), brusture (*Arctium lappa*) – fără pețiol, păpădie (*Taraxacum officinale*), podbal (*Tussilago farfara*), vineriță (*Ajuga reptans*), lăcrimioară (*Convallaria majalis*), **plante (herba)** de cârcel (*Ephedra distachya*), calcea-calului (*Caltha palustris*), luminoasă (*Clematis recta*), mărul-lupului (*Aristolochia clematidis*), mac-cornut sau mac-galben (*Glaucium flavum*), fumariță (*Fumaria officinalis*), floarea-cucului (*Lychnis flos-cuculi*), troscot (*Polygonum aviculare*), iarbă-de-șoldină (*Sedum acre*), turiță-mare (*Agrimonia eupatoria*), crețișoară (*Alchemilla xanthochlora*), crețușcă (*Filipendula ulmaria*), coada-racului (*Potentilla anserina*), cebare sau sorbestrea (*Sanguisorba officinalis*), ciumărea (*Galega officinalis*), sulfină (*Melilotus officinalis*), pufuliță (*Epilobium hirsutum*), pufuliță-cu-flori-mici (*Epilobium parviflorum*), răchitan (*Lythrum salicaria*), priboi (*Geranium macrorrhizum*), amăreală (*Polygala amara*), mărar (*Anethum graveolens*), cucută (*Conium maculatum*), sănișoară (*Sanicula europaea*), sunătoare (*Hypericum perforatum*), trei-frați-pătați (*Viola tricolor*), crușătea (*Barbarea vulgaris*), traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), năsturel (*Nasturtium officinale*), brâncuță (*Sisymbrium officinale*), scânteuță (*Anagalis arvensis*), drețe (*Lysimachia nummularia*), gălbinele (*Lysimachia vulgaris*), sânziene-albe (*Galium mollugo*), vinariță (*Galium odoratum*), sânziene-galbene (*Galium verum*), roibă (*Rubia tinctorum*), volbură (*Convolvulus arvensis*), limba-boului (*Anchusa officinalis*), iarba-șarpelui (*Echium vulgare*), limba-mielului (*Borago officinalis*), mei-păsăresc (*Lithospermum officinale*), mierea-ursului (*Pulmonaria officinalis*), silur (*Euphrasia rostkoviana*), buberic (*Scrophularia nodosa*), ventricică (*Veronica officinalis*), sporici (*Verbena officinalis*), vineriță (*Ajuga reptans*), isop (*Hyssopus officinalis*), urzică-moartă albă (*Lamium album*), urzică-moartă (*Lamium purpureum*), talpa-gâștei (*Leonurus cardiaca*), cervană (*Lycopus europaeus*), izma-broaștei (*Mentha aquatica*), izmă-bună (*Mentha × piperita*), cătușnică (*Nepeta cataria*), busuioc-sălbatic (*Prunella vulgaris*), cînsteț (*Salvia glutinosa*), iarba Sfântului-Ioan (*Salvia sclarea*), cimbru-de-grădină (*Satureja hortensis*), cimbrisor (*Thymus serpyllum*), coada-șoricelului (*Achillea millefolium*), pelin-alb (*Artemisia absinthium*), schinel (*Cnicus benedictus*),

vulturică (*Hieracium pilosella*), păpădie (*Taraxacum officinale*), holeră (*Xanthium spinosum*), **flori (flores sau flos)** de nemțisor-de-câmp (*Consolida regalis*), mac-roșu (*Papaver rhoeas*), cretușcă (*Filipendula ulmaria*), aglică (*Filipendula vulgaris*), drobiță (*Genista tinctoria*), sulfină (*Melilotus officinalis*), salcâm (*Robinia pseudoacacia*), trifoi-alb (*Trifolium repens*), trifoi-roșu (*Trifolium pratense*), bob (*Vicia faba*), ciocul-berzei (*Erodium cicutarium*), salbă-moale (*Euonymus europea*), cătină-roșie (*Tamarix ramosissima*), drobușor (*Isatis tinctoria*), tei-pucios (*Tilia cordata*), tei-cu-frunză-mare (*Tilia platyphyllos*), tei-alb (*Tilia tomentosa*), nalbă-de-cultură (*Malva glabra*), nalbă-de-pădure (*Malva sylvestris*), lemn-câinesc (*Ligustrum vulgare*), soc (*Sambucus nigra*), limba-boului (*Anchusa officinalis*), limba-mielului (*Borago officinalis*), vineriță (*Ajuga reptans*), urzică-moartă-albă (*Lamium album*), levănțică (*Lavandula angustifolia*), coada-șoricelului (*Achillea millefolium*), talpa-mâței (*Antennaria dioica*) – inflorescențele femele, arnică (*Arnica montana*), gălbenele (*Calendula officinalis*), mușețel (*Chamomilla recutita*), crin-alb (*Lilium candidum*), **scoartă (cortex)** de pe **ramuri tinere, rădăcini și tulpini** de castan (*Castanea sativa*), mesteacăn (*Betula pendula*), alun (*Corylus avellana*), scumpie (*Cotinus coggygria*), salbă-moale (*Euonymus europea*), cătină-mică (*Myricaria germanica*), cătină-roșie (*Tamarix ramosissima*), **fructe (fructus)** și **semințe (semen)** de cocăz-roșu (*Ribes rubrum*), agriș (*Ribes uva-crispa*), căpșuni (*Fragaria moschata Duchesne*), măr (*Malus domestica* sau *Malus pumila*), moșmon (*Mespilus germanica*), cireș (*Prunus avium* sau *Cerasus avium*), păr (*Pyrus sativa*), bob (*Vicia faba*), chimen (*Carum carvi*), cucută (*Conium maculatum*), pătrunjel (*Petroselinum hortense*), anason (*Pimpinella anisum*), cătină-mică (*Myricaria germanica*), crușătea (*Barbarea vulgaris*), brâncuță (*Sisymbrium officinale*), brândușă-de-toamnă (*Colchicum autumnale*), grâu (*Triticum aestivum vulgare*)...

Insecte:

Larva fluturului *Procllossiana eunomia* se transformă în crizalidă și către sfârșitul lunii iese în stadiul adult, depunându-și ouăle pe frunzele răculețului (*Polygonum bistorta*). Ouăle fluturului *Anthocharis cardamines* devin omizi. Libelulele (*Libellula depressa*) zboară câte două, fiind agățate una de cealaltă. Din ouăle de libelulă ies niște larve care vor trăi 1-2 ani în apă. Între frunzele răsucite ale plopului-negru (*Populus nigra*) se pot acuma găsi și observa larvele țigărarului (*Byctiscus populi*).

Pești:

În luna iunie încep să-și depună icrele următoarele specii de pești: plevușca (*Leucaspius delineatus*), boișteanul sau crăietele (*Phoxinus phoxinus*) și somnul (*Silurus glanis*). Continuă reproducerea beldița (*Alburnoides bipunctatus*), morunașul (*Vimba vimba*) și ghidrinul (*Gasterosteus aculeatus*). Totodată iunie este ultima lună de depunere a icrelor pentru chișcar-de-râu (*Lampetra fluviatilis*), chișcar-mic (*Lampetra planeri*), șip (*Acipenser sturio*), cegă (*Acipenser ruthenus*), babușcă (*Rutilus rutilus* sau *Leuciscus rutilus*), clean (*Squalius cephalus* sau *Leuciscus cephalus*), roșioară (*Scardinius erythrophthalmus*), porcușor (*Gobio gobio*), porcușor-de-vad (*Gobio uranoscopus*), mreană (*Barbus barbus*), oblete-mare (*Chalcalburnus chalcoides*), batcă (*Blicca bjoerkna*), plătică (*Abramis brama*), sabiță (*Pelecus cultratus*), caracudă sau caras (*Carassius carassius*), țipar sau vârlan (*Cobitis fossilis* sau *Misgurnus fossilis*), șalău (*Lucioperca lucioperca*), iar uneori pentru lin (*Tinca tinca*) și oblete (*Alburnus alburnus*).

La munte pescuitul este permis pentru toate speciile de salmonide. Lostrita și mihalțul sunt specii strict interzise. În a doua jumătate a lunii se deschide pescuitul și în apele naturale, colinare și de șes. Rezultate bune se obțin la crap (*Cyprinus carpio*), caras (*Carassius auratus*), plătică (*Abramis brama*), babușcă (*Rutilus rutilus*), scoabar (*Chondostroma nasus*), dar și la răpitori – știucă (*Esox lucius*), biban (*Perca fluviatilis*), șalău (*Lucioperca*

lucioperca), somn (*Silurus glanis*), avat (*Aspius aspius*). Luna iunie este una dintre cele mai bune perioade de pescuit ale anului.

Reptile:

Tritonul (*Triturus vulgaris*) părăsește uneori bălțile pentru a trăi în ascunzători răcoroase și umede. Broasca-de-lac (*Rana esculenta*) își depune ouăle, sub formă de grămadă gelatinoasă, pe fundul bălților, spre deosebire de alte broaște la care ouăle plutesc și sunt depuse mult mai repede.

Păsări:

Cristelul-de-câmp (*Crex crex*) cântă prin pajiștile umede iar după jumătatea lunii depune ouăle. Primii pui de rândunică (*Hirundo rustica*) și de stârc (*Ardea cinerea*) încep să zboare dar sunt hrăniți în continuare de părinți. Puii cormoranului-mare (*Phalacrocorax carbo*) ies din cuib, iar ai corcodelului-moțat (*Podiceps cristatus*) încep să plonjeze. Presura-galbenă (*Emberiza citrinela*) continuă să cânte. Frecventează culturile, desigurile și boscheții căutând semințe pe sol. În această perioadă pot fi observați și puii de lișiță (*Fulica atra*).

Alte aspecte specifice lunii iunie: Uliul-păsărar (*Accipiter nissus*): femela se ocupă de pui distribuindu-le bucăți de carne pe care nu sunt capabili să le sfâșie singuri. Huhurezul-mic (*Strix aluco*): puii explorează împrejurimile dar nu pot să zboare și sunt încă hrăniți de părinți. Cucul (*Cuculus canorus*): într-un cuib de măcăleandru (*Erithacus rubecula*) se recunoaște greu un ou de cuc, totuși acesta este puțin mai mare decât al părinților adoptivi. Ciocănitoarea-pestriță-mare (*Dendrocopos major*): femela depune ouăle în cuibul amenajat de mascul care asigură și cea mai mare parte a clocitului. Gaița (*Garrulus glandarius*): în decursul acestei luni puii părăsesc cuibul dar rămân tot cu părinții lor. Pițigoiful-mare (*Parus major*): femela clocește al doilea rând de ouă iar masculul îi aduce insecte. Țicleanul (*Sitta europaea*): puii cresc foarte încet, rămânând în cuib 24 de zile. Ambii părinți le aduc insecte și le curăță cuibul de excremente. Ochiuboului (*Troglodytes troglodytes*): masculul repară cuiburile goale – fiind poligam el construiește primăvara mai multe cuiburi – iar după prima pontă cucerește alte femele. Muscarul-gulerat (*Ficedula albicollis*): masculul și femela le aduc puilor care piuie înfometăți insecte cu rândul. Măcăleandru (*Erithacus rubecula*): dacă femela clocește din nou doar masculul singur va asigura hrana puilor din seria precedentă. Mierla (*Turdus merula*): se împerechează din nou pentru a doua pontă iar după ce ies puii părinții le aduc multe insecte. Silvia-cu-cap-negru (*Sylvia atricapilla*): după zece zile, în luna iunie, puii părăsesc cuibul și se ascund în tufișuri, fiind supravegheați de părinți. Pitulicea-fluierătoare (*Phylloscopus trochilus*): ambii părinți hrănesc cu insecte puii primei serii care rămân ascunși în cuib. Fâsa-de-pădure (*Anthus trivialis*): masculul îi mai hrănește cu insecte pe puii care sunt pregătiți să-și părăsească cuibul. Graurul (*Sturnus vulgaris*): după ce puii primei serii devin autonomi, va fi depus un alt rând de ouă. Forfecuța (*Loxia curvirostra*): puii celei de-a doua ponte, aflați în „penele cele rele”, juvenile, se alătură stolurilor venite din nord, atunci când producția de semințe la molid este slabă, și de regulă nu se mai întorc. Botgrosul (*Coccothraustes coccothraustes*): părinții hrănesc puii cu insecte și larve de insecte. Cinteza (*Fringilla coelebs*): femela construiește alt cuib pentru a putea depune seria a doua de ouă. Masculul se ocupă de puii din prima serie. Aceștia, chiar dacă vor părăsi cuibul, trei săptămâni mai depind încă de adult. Porumbelul-gulerat (*Columba palumbus*): puii pleacă pentru ca părinții să se poată ocupa de poanta a doua. Beau apă precum adulții, aspirând-o fără ca să-și ridice capul. Cocoșul-de-munte (*Tetrao urogallus*): puii după ce au stat timp de trei săptămâni pe lângă mama lor pleacă, devenind astfel independenți. Ierunca (*Bonasa bonasia*): puii ies din ou aproape în același timp, sunt gălăgioși și se pun în mișcare.¹

¹ Cf. Christiane Haguenauer – *Les oiseaux et la forêt*, Delachaux et Niestlé, Paris, 1997

Se vânează cioara-grivă (*Corvus corone cornix*), cioara-grivă-sudică (*Corvus corone sardonius*), cioara-de-semănătură (*Corvus frugilegus*), cioara-neagră (*Corvus corone corone*) și coțofana (*Pica pica*)²

Mamifere:

Liliecii nasc câte un singur pui, fiind alăptat timp de 4-6 săptămâni, până când începe să zboare și să vâneze insecte. La liliacul-de-seară (*Nyctalus noctula*) masculii și femelele se regroupează acuma în locuri diferențiate pe sexe. Adunate laolaltă în maternități, femelele gestante nasc. Puii de câteva zile se disting prin faptul că au pielea roză și fără păr, fiind fixați bine pe o mamelă. Liliacul-urecheat (*Plecotus auritus*) își ține corpul ridicat pe verticală spre a executa un zbor staționar, capturând insecte de pe frunze, în special omizile.

În luna iunie le cad coarnele la cerbii de de 1-2 ani, *Cervus elaphus*. Mistreții (*Sus scrofa*) își continuă năpârlirea până pe la jumătatea lunii. Se nasc puii dihorului (*Mustela putorius*). Prin tufișuri se aude chițăitul chițcanului-de-pădure (*Sorex araneus*). Acuma se nasc iezii de căprior (*Capreolus capreolus*) capabili să umble și să sară după numai câteva ore. Au blana pătată cu alb, imitând astfel jocurile de umbre și de lumini ale vegetației arborescente din pădure. Totodată continuă năpârlirea adulților. La începutul lunii fată marmota (*Marmota marmota*). Încep fătările și la cerb-lopătar (*Dama dama*), capră-neagră (*Rupicapra rupicapra*), la această specie ținând până la jumătatea lunii. Continuă fătările la cerb-comun (*Cervus elaphus*), iepure (*Lepus europaeus*), râs (*Lynx lynx*), viezure (*Meles meles*), bizam (*Ondatra zibethicus*), dihor (*Mustela putorius*)...

Iepurele (*Lepus europaeus*), bizamul (*Ondatra zibethicus*), viezurele (*Meles meles*) vor continua să se împerecheze.

Capra-neagră (*Rupicapra rupicapra*) are în această lună o blană de culoare roșcată.

Se vânează căpriorul (*Capreolus capreolus*) – exemplare masculine precum și căpriorii degenerați, pentru a nu participa la împerechere și vulpea (*Vulpes vulpes*)³

Alte aspecte: La Năsăud (47° 17' N, 24° 24' E) în prima săptămână, incompletă, socotită doar pe 4 zile, lumina câștigă 5 minute, în săptămâna a doua, 7 minute, în săptămâna a treia, 3 minute, după care în săptămâna a patra, post solstițiu, lumina scade cu 3 minute, iar în săptămâna a 5-a, incompletă, socotită doar pe 5 zile, lumina pierde în durată alte 3 minute.

Precizare: La solstițiu de vară ziua are la Năsăud, o durată de 15 ore și 56 minute, iar noaptea 8 ore și 4 minute. Rotunjind putem spune că raportul lumină/întuneric este de 16 la 8.

Gavrilă Neamț - EUROPEA ROMANIA

² Cf. www.vanatoare-vanator.ro

³ Cf. www.vanatoare-vanator.ro